

Agaricales s.l. (Lamellenpilze)

außer Sprödblättlern und außer cyphelloiden Pilzen

Agaricus L.: Fr. emend. Karst. (Agaricaceae)

= *Psalliota* (Fr.) Kumm.

Agaricus abruptibulbus s. *A. essettei*

Agaricus aestivalis (Möll.) Pil.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/45 (var. *veneris*)

Agaricus arvensis Schaeff.: Fr., Weißer Anischampignon

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/67; RH 409

Agaricus augustus Fr., Riesenchampignon

= *A. perrarus* Schulz.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1727; CE 3/75; RH 408

Agaricus bisporus (J. Lge.) Imbach agg., Zweisporiger Champignon

Nachw.: KR 1B

A. bisporus var. *bisporus*

Abb.: C 2613; CE 3/21

A. bisporus var. *albidus* (J. Lge.) Sing.

= *A. hortensis* (Cke.) Imai

Abb.: CE 3/23

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. agg., Stadt-Champignon

= *Psalliota edulis* Vitt.

Nachw.: KR 1B

A. bitorquis var. *bitorquis*

Abb.: CE 3/19

A. bitorquis var. *validus* (Möll.) Bon et Cap.

Agaricus bresadolianus Bohus, Wurzelnder Champignon

= *A. campestris* L.: Fr. var. *radicatus* {??Klammer??} Vitt. ss. Bres.; = *A. radicatus* Vitt. ss. Bres.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/71

Agaricus campestris L.: Fr., Wiesen-Champignon

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/53; RH 405

Agaricus campestris var. *radicatus* ss. Bres. s. *A. bresadolianus*

Agaricus comtulus Fr., Triften-Zwergchampignon

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/83

Agaricus dulcidulus Schulz., Keulenfüßiger Zwergchampignon

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1731

Agaricus edulis s. *A. bitorquis*

Agaricus essettei Bon, Schiefknolliger Anischampignon

= *A. abruptibulbus* Peck ss. auct.

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 409

Agaricus fuscofibrillosus (Möll.) Pil., Dunkelfaseriger Champignon

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980; Reisrod b. Gees 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B

Agaricus haemorrhoidarius s. *A. silvaticus*

Agaricus hortensis s. *A. bisporus* var. *albidus*

Agaricus langei (Möll.) Möll., Großsporiger Blut-Champignon

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/41; RH 406

Agaricus luteomaculatus (Möll.) Möll., Gelbfleckender Zwergchampignon

Nachw.: KR 1B

Agaricus macrocarpus (Möll.) Möll., Großer Anischampignon

Beleg: Berlingen 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B

Agaricus macrosporus (Möll. et J. Schff.) Pil., Großsporiger Champignon

Nachw.: KR 1B

Agaricus meleagris s. *A. praeclaresquamosus*

Agaricus nivescens (Möll.) Möll., Rundsporiger Champignon

Beleg: Berlingen 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2614 und 2614b

Agaricus perrarus s. *A. augustus*

Agaricus placomyces s. *A. praeclaresquamosus*

Agaricus porphyrizon Ort., Purpurfaseriger Champignon

= *A. purpurascens* (Cke.) Pil. non Fr.

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/85

Agaricus praeclaresquamosus Freeman, Perlhuhn-Champignon

= *A. meleagris* (J. Schff.) Imbach; = *A. placomyces* Peck; = *A. placomyces* var. *meleagris* J. Schff.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/59 und 57 (var. *terricolor*)

Agaricus purpurascens s. *A. porphyrizon*

Agaricus purplellus (Möll.) Möll., Purpur-Zwergchampignon

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1732; CE 3/81

Agaricus radicans Vitt. ss. Bres. s. *A. bresadolianus*

Agaricus semotus Fr., Weinrötlicher Zwergchampignon

Beleg: Müllenborn 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/83

Agaricus silvaticus Schaeff.: Fr., Wald-Champignon

=? *A. haemorrhoidarius* Kalchbr. et Schulz. ss. Mos. [non ss. J. Lge.]

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/49 und 43 (*A. haemorrhoidarius*)

Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc., Dünnfleischiger Anischampignon

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B

Agaricus vaporarius (Vitt.) Mos., Kompost-Champignon

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/31

Agaricus xanthoderma Genev., Karbol-Champignon

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/51; RH 407

***Agrocybe* Fay. (Bolbitiaceae)**

Agrocybe arenaria s. *A. semiorbicularis*

Agrocybe arenicola s. *A. semiorbicularis*

Agrocybe arvalis (Fr.) Sing., Geschwänzter Sklerotien-Ackerling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/249

Agrocybe dura (Bolt.: Fr.) Sing., Rissiger Ackerling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/241; C 2240 (*A. dura* var. *xanthophylla* Bres.)

Agrocybe erebia (Fr.) Kühn., Leberbrauner Ackerling

= *A. ombrophila* (Fr.) Karst.

Beleg: Oos 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2234; RH 439

Agrocybe ombrophila s. *A. erebia*

Agrocybe paludosa (J. Lge.) Kühn. et Romagn., Sumpfwiesen-Ackerling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2666

Agrocybe pediades s. *A. semiorbicularis*

Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fay., Frühlings-Ackerling

=? *A. sphaleromorpha* (Bull.: Fr.) Fay.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: RH 440

Agrocybe putaminum (Mre.) Sing., Falber Ackerling

Nachw.: KR 1B

Agrocybe semiorbicularis (Bull. ex St. Am.) Fay., Halbkugeliger Ackerling

= *A. arenaria* (Peck) Sing.; = *A. arenicola* (Berk.) Sing.; = *A. pediades* (Fr.) Fay.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2235; CE 3/251

Agrocybe sphaleromorpha s. *A. praecox*

Agrocybe vervacti (Fr.) Sing., Hohlstieliger Ackerling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/247

***Alnicola* Kühn. (Cortinariaceae)**

(z.T. zu *Naucoria* gestellt)

Alnicola alnetorum (Mre.) ??Kühn. et Romagn.

= *Naucoria celluloderma* Ort.

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/421

Alnicola amarescens (Quél.) Romagn., Bitterer Erlenschnitzling

Nachw.: KR 1B

Alnicola bohémica (Vel.) Sing., Weißstieliger Erlenschnitzling

Nachw.: EBERT, 1987

Alnicola cedriolens Brsky. et Schmid-Heckel

Nachw.: KR 1B

Alnicola clavuligera Romagn.

Nachw.: KR 1B

Alnicola escharoides s. *A. melinoides*

Alnicola luteolofibrillosa Kühn., Faseriger Erlenschnitzling

Beleg: Gerolstein 5705, JF 1980; Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2237

Alnicola melinoides (Bull.: Fr.) Kühn., Honiggelber Erlenschnitzling

= *Naucoria escharoides* (Fr.: Fr.) Kumm.

Beleg: Moß b. Gerolstein 5706, HA 1980 (als *Naucoria escharoides*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 481

Alnicola paludosa (Peck) Sing.

= *Naucoria striatula* Ort. non ss. Reid

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1772

Alnicola phaea s. *A. scolecina*

Alnicola scolecina (Fr.) Romagn., Kahler Erlenschnitzling

= *Naucoria phaea* Mre.

Nachw.: KR 1B

Alnicola sphagneti Ort.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2238

Alnicola striatula s. *A. paludosa*

Alnicola subconspersa (Kühn. ex Ort.) Mos., Behangener Erlenschnitzling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/421

Alnicola submelinoides (J. Lge.) Kühn.

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2239

***Amanita* Pers. (Amanitaceae)**

Amanita alba s. *A. vaginata* var. *alba*

Amanita aspera s. *A. franchetii*

Amanita battarrae Boud., Verfärbender Scheidenstreifling

= *A. umbrinolutea* Secr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/623; RH 396

Amanita ceciliae (Berk. et Br.) Bas, Riesen-Scheidenstreifling

= *A. inaurata* Secr. ex Gill.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/629; RH 394

Amanita citrina (Schaeff.) S. F. Gray, Gelber Knollenblätterpilz

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *A. mappa*); FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 2/663 und 665; RH 400

Amanita crocea (Quél.) Sing., Orange-gelber Scheidenstreifling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/621; RH 395

Amanita eliae Quél., Kammrandiger Wulstling

Nachw.: KR 1B

Amanita excelsa (Fr.) Bertil., Grauer Wulstling

= *A. spissa* (Fr.) Kumm.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 2/679, 681 und 683; RH 402

Amanita franchetii (Boud.) Fay., Rauher Wulstling

= *A. aspera* (Fr.) S. F. Gray

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/687 und 689; RH 401

Amanita friabilis (Karst.) Bas, Erlen-Scheidenstreifling

Nachw.: FRENCKEN, 1971/72 (als *A. sternbergii*); KR 1B - Abb.: C 2151

Amanita fulva Sing., Fuchsiges Scheidenstreifling

= *A. vaginata* var. *fulva* (Sing.)

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/613

Amanita gemmata (Fr.) Bertil., Narzissengelber Wulstling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/647 und 649 (var. *exannulata*)

Amanita inaurata s. *A. ceciliae*

Amanita lividopallescens Gill., Ockergrauer Scheidenstreifling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/627

Amanita magnivolvata Aalton

(vgl. *A. pachyvolvata* (Bon) Krglst., identisch??)

leg. et det. B. Oertel, Mürlenbach 5805, **Erstnachweis für die Eifel** - Abb.: C 1698

Amanita mairei Foley, Silbergrauer Scheidenstreifling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/625

Amanita muscaria (L.) Pers., Fliegenpilz

Beleg: Monschau 5403, L 1971 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 2/637 und 639; RH 397

Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krbh., Pantherpilz

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: C 1694, 2583 und 2583b; CE 2/643 und 645 (var. *abietinum*); RH 398

Amanita phalloides (Fr.) Link var. *phalloides*, Grüner Knollenblätterpilz

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 2/653 und 655; RH 399

Amanita porphyria Alb. et Schw.: Fr., Porphyrbrauner Wulstling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 2/667; RH 400

Amanita pseudorubescens s. *A. rubescens*

Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S. F. Gray, Perlpilz

= *A. pseudorubescens* Herrf.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; JAAP, 1910 (als *A. pustulata*); KR 1B - Abb.: CE 2/675; RH 401

Amanita solitaria ss. Kühn. et Romagn. s. *A. strobiliformis*

Amanita spissa s. *A. excelsa*

Amanita strobiliformis (Paul.: Vitt.) Bertil., Fransiger Wulstling

= *A. solitaria* (Bull.: Fr.) Mér. ss. Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/697 und 699

Amanita subalpina s. *A. submembranacea*

Amanita submembranacea (Bon) Grög., Grauhütiger Scheidenstreifling

=? *A. subalpina* Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1699; CE 2/633 (*A. subalpina*)

Amanita umbrinolutea s. *A. battarae*

Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vitt. agg., Grauer Scheidenstreifling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B

A. vaginata var. *vaginata*

Abb.: CE 2/615

A. vaginata var. *alba* (Gill.) ??Autor

= *A. alba* Gill.

Abb.: CE 2/611

A. vaginata var. *fulva* s. *A. fulva*

Amanita virosa (Fr.) Bertil., Kegelhütiger Knollenblätterpilz

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 2/659; RH 399

Anellaria s. *Panaeolus*

Armillaria (Fr.: Fr.) Staude (Tricholomataceae)

= *Armillariella* (Karst.) Karst.

(z.T. bei *Clitocybe* mit untergebracht)

Lit.: TERMORSHUIZEN und ARNOLDS (1987)

Armillaria borealis Marxm. et Korh.

Nachw.: EBERT, 1987

Armillaria bulbosa (Barla) Kile et Watl.

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: C 1702, 2588 und 2588b (als *A. gallica*)

Armillaria cepistipes Vel., Zwiebelfüßiger Hallimasch

incl. f. *pseudobulbosa* Romagn. et Marxm.

Abb.: BK 3/133

Armillaria ectypa (Fr.) Sing., Moor-Hallimasch

Nachw.: KR 1B

Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm. ss. str., Honigfarbener Hallimasch

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: BK 3/134

Armillaria obscura (Schaeff.) Herink, Dunkler Hallimasch

= *A. ostoyae* Romagn.; = *A. polymyces* (Pers. emend. Sing. et Clém.) Herink

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: BK 3/135; CE 2/313

Armillaria ostoyae s. *A. obscura*

Armillaria polymyces s. *A. obscura*

Armillaria tabescens (Scop.: Fr.) Sing., Ringloser Hallimasch

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 2/315

***Arrhenia* Fr. (Tricholomataceae)**

s. auch *Leptoglossum*, *Omphalina* und *Rimbachia*

Arrhenia muscigena s. *A. spathulata*

Arrhenia queletii s. *A. spathulata*

Arrhenia retirugis (Bull.: Fr.) Redhead, Netziger Adermoosling

= *Leptoglossum retirugum* (Bull.) Rick.

Nachw.: KR 1B

Arrhenia spathulata (Fr.) Readhead, Gezonter Adermoosling

= *Leptoglossum muscigenum* (Bull.) Karst.; = *L. queletii* (Pil. et Svrc.) Corner

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/139; CE 2/319; RH 297

***Aspropaxillus* Kühn. et Mre. (Tricholomataceae)**

Aspropaxillus giganteus (Sow.: Fr.) Kühn. et Mre., Riesen-Krempentrichterling

= *Leucopaxillus candidus* (Bres.) Sing.; = *Leucopaxillus g.* (Sow.: Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/251; CE 2/377; RH 310

Asterophora* s. *Nyctalis

***Baeospora* Sing. (Tricholomataceae)**

Baeospora conigena s. *B. myosura*

Baeospora myosura (Fr.: Fr.) Sing., Mäuseschwanz

= *Collybia conigena* Pers. ex Fr.

Beleg: Gerolstein 5706, Biol. Stat. Weijster; Reisrod b. Gees 5706, Biol. Stat. Weijster - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/140; CE 2/523; RH 370

Baeospora myriadophylla (Peck) Sing., Violettblättriger Winterrübling

= *Collybia m.* Peck

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/141

Biannularia* s. *Catathelasma

***Bolbitius* Fr. (Bolbitiaceae)**

Bolbitius aleuriatus s. *B. reticulatus*

Bolbitius pluteoides s. *B. reticulatus*

Bolbitius reticulatus (Pers.: Fr.) Rick., Netzaderiger Mistpilz

= *B. aleuriatus* (Fr.: Fr.) Sing.; =? *B. pluteoides* Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1741; RH 437

Bolbitius variicolor s. *B. vitellinus* var. *variicolor*

Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr. var. *vitellinus*, Gold-Mistpilz

=? *B. vitellinus* var. *fragilis* L. ex Fr.; =? *B. vitellinus* var. *titubans* Bull. ex Fr.

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/229; C 2210 (var. *titubans*); RH 437

Bolbitius vitellinus var. *variicolor* (Atk.) Krglst.

= *B. variicolor* Atk.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/227

***Calocybe* Kühn.: Donk (Tricholomataceae)**

(Z.T. mit zu *Lyophyllum* gestellt)

Calocybe carnea (Bull.: Fr.) Donk, Fleischrosa Schönkopf

=? *C. persicolor* (Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/142; CE 2/365 oben und 365 unten (*C. persicolor*); RH 305

Calocybe cerina (Pers.: Fr.) Donk, Wachsgelber Schönkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/363; RH 304

Calocybe chrysenteron (Bull.: Fr.) Sing., Dottergelber Schönkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/143

Calocybe gambosa (Fr.) Donk, Maipilz

= *Lyophyllum georgii* (Clus.) Sing.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Tricholoma georgii*); FUCHS, 1993 (als *Tricholoma georgii*); KR 1B - Abb.: BK 3/144; CE 2/351; RH 303

Calocybe georgii s. *C. gambosa*

Calocybe ionides (Bull.: Fr.) Donk var. *ionides*, Veilchenblauer Schönkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/145; CE 2/359

Calocybe persicolor s. *C. carnea*

***Camarophyllus* (Fr.) Kumm. (Tricholomataceae)**

(z.T. mit *Hygrophorus* in eine Gattung gestellt)

Camarophyllus colemannianus (Blox. in Berk. et Br.) Rick., Dattelbrauner Ellerling

= *C. subradiatus* (Schum.: Fr.) Wünsche

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/84

Camarophyllus fuscescens (Bres.) Mos., Bräunlicher Ellerling

= *C. virgineus* (Wulf.: Fr.) Kumm. var. *fuscescens* Bres.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/104; CE 2/81

Camarophyllus grossulus s. *Omphalina grossula*

Camarophyllus niveus s. *C. virgineus*

Camarophyllus pratensis (Pers.: Fr.) Kumm. agg.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B

C. pratensis var. *pratensis*, Orangefarbiger Wiesen-Ellerling

Mürtenbach 5805, leg. et det. B. Oertel

Abb.: BK 3/76; CE 2/79; RH 250

C. pratensis var. *pallidus* (Cke.) J. Lge.

Beleg: leg. H. G. Fuchs, B. Oertel, J. Strick und R. Wingender 16.10.94, Baasem, det. B. Oertel,
Erstnachweis für die Eifel - Abb.: C 2443 (als *Hygrophorus berkeleyi* Ort.)

Camarophyllus russocoriaceus (Berk. et Mill.) J. Lge., Juchten-Ellerling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/77; CE 2/75; RH 249

Camarophyllus subradiatus s. *C. colemannianus*

Camarophyllus virgineus (Wulf.: Fr.) Kumm., Weißer Ellerling

= *C. niveus* (Scop.: Fr.) Wünsche

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993;
KR 1B - Abb.: BK 3/103; CE 2/75 und 77

Camarophyllus virgineus var. *fuscescens* s. *C. fuscescens*

***Cantharellula* Sing. (Tricholomataceae)**

Cantharellula umbonata (Gmel.: Fr.) Sing., Rötender Wachstrichterling

= *Hygrophoropsis umbonata* (Pers.: Fr.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/146; C 1914; RH 307

***Catathelasma* Lovejoy (Tricholomataceae)**

Catathelasma imperiale (Quél.) Sing., Wurzelmöhrling

= *Biannularia imperialis* (Fr.) G. Beck

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/147; CE 2/411; RH 314

***Chamaemyces* Batt.: Earle (Agaricaceae)**

Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk

= *Lepiota irrorata* Quél.

Beleg: Oos 5705, JG 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/89

***Cheimonophyllum* Sing. (Tricholomataceae)**

Cheimonophyllum candidissimum (Berk. et Curt.) Sing., Kreide-Seitling

= *Pleurotellus candidissimus* (Berk. et Curt.) ??Autor

Beleg: Hinterhausen 5705, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 316

***Chroogomphus* s. *Gomphidius* bei den Röhrlingen und Verwandten**

***Clitocybe* (Fr.) Staude (Tricholomataceae)**

s. auch *Armillaria*

Clitocybe admissa s. *Lyophyllum palustre*

Clitocybe agrestis Harm., Wiesen-Trichterling

= *C. angustissima* (Lasch: Fr.) Kumm.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2374 und 2758

Clitocybe alba s. *C. nebularis*

Clitocybe alexandri (Gill.) Konr., Buchsblättriger Trichterling

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/157; RH 269

Clitocybe angustissima s. *C. agrestis*

Clitocybe anisata Vel.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1900

Clitocybe brumalis s. *C. marginella*

Clitocybe caccabus (Fr.) Gill., Schokoladenbrauner Trichterling

(vgl. *Pseudoclitocybe cyathiformis*)

Nachw.: EBERT, 1987

Clitocybe candicans (Pers.: Fr.) Kumm., Wachsstieler Trichterling

= *C. tenuissima* Romagn.

Beleg: leg. et det. T. Kuyper 03.10.87, Müllenborn, PE; Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/152; C 1898

Clitocybe cerussata s. *C. phyllophila*

Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) Kumm., Keulenfuß-Trichterling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/154; CE 2/155; RH 268

Clitocybe connata s. *Lyophyllum connatum*

Clitocybe costata Kühn. et Romagn., Kerbrandiger Trichterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/155; CE 2/167

Clitocybe dealbata (Sow.: Fr.) Kumm., Feld-Trichterling

=? *C. rivulosa* (Pers.: Fr.) Kumm.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/156; C 1899; CE 2/179; RH 274 (*C. rivulosa*)

Clitocybe diatreta (Fr.: Fr.) Kumm., Fleischfalber Trichterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2375

Clitocybeicolor s. *C. metachroa*

Clitocybe ditopus (Fr.: Fr.) Gill., Mehl-Trichterling

= *C. ditopa*

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/157; CE 2/185

Clitocybe flaccida s. *Lepista f.*

Clitocybe foetens Melot

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/159; C 2757

Clitocybe fragrans (With.: Fr.) Kumm., Duft-Trichterling

= *C. suaveolens* (Schum.: Fr.) Kumm.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, PE.... - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/160; C 1901; CE 2/181; RH 274

Clitocybe fritilliformis s. *C. phaeophthalma*

Clitocybe geotropa (Bull.: Fr.) Quél., Mönchskopf

=? *C. maxima* (Wett.: Fr.) Kumm.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/162

Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) Kumm., Ockerbrauner Trichterling

= *C. infundibuliformis* (Schaeff.) Quél.

Beleg: Gerolstein 5705, RIN 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/163; CE 2/165

Clitocybe gilva s. *Lepista flaccida* f. *gilva*

Clitocybe houghtonii (Phil. in Berk. et Br.) Dennis

= *C. incarnata* Métr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2373

Clitocybe hydrogramma s. *C. phaeophthalma*

Clitocybe incarnata s. *C. houghtonii*
Clitocybe infundibuliformis s. *C. gibba*

Clitocybe inornata (Sow.: Fr.) Gill., Graublättriger Trichterling
Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/165; CE 2/159

Clitocybe inversa s. *Lepista flaccida*
Clitocybe langei s. *C. vibecina*
Clitocybe lentiginosa s. *Ossicaulis lignatilis*
Clitocybe lignatilis s. *Ossicaulis l.*

Clitocybe marginella Harm. [non ss. Lamoure], Winter-Trichterling
= *C. brumalis* (Fr.: Fr.) Kumm.
Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/151; C 1902

Clitocybe maxima s. *C. geotropa*

Clitocybe metachroa (Fr.) Quél., Zweifarbiger Trichterling
= *C. dicolor* (Pers.: Pers.) Murr.; = *C. metachroides* Harm.
Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/169; C 2379 und 2380

Clitocybe metachroides s. *C. metachroa*

Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) Kumm., Nebelkappe
=? *C. alba* (Bat.) Sing.; = *Lepista nebularis* (Batsch: Fr.) Harm.
Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/170; CE 2/193; RH 279

Clitocybe obsoleta (Batsch: Fr.) Quél., Verblichener Trichterling
Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/171; C 2372

Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kumm., Grüner Anistrichterling
Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/172 und 173; C 1897 und 2370 (weiße Varietät); CE 2/153

Clitocybe olearia s. *Omphalotus olearius*
Clitocybe pausiaca s. *C. vibecina*

Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyp., Ranziger Trichterling
= *C. fritilliformis* (Lasch in Fr.) Gill.; = *C. hydrogramma* (Bull.: Fr.) Kumm.

Belege: leg. et det. B. Oertel 06.09.86, Sötenich, PE....; Gerolstein 5705, L 1980; Gerolstein 5705, RIN 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/175; CE 2/177

Clitocybe phyllophila (Fr.) Kumm., Bleiweißer Trichterling

= *C. cerussata* (Fr.) Kumm.; = *C. pithyophila* (Fr.) Gill.

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/176; CE 2/175

Clitocybe pithyophila s. *C. phyllophila*

Clitocybe radicellata Gill.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/171; RH 272

Clitocybe rivulosa s. *C. dealbata*

Clitocybe sinopica (Fr.: Fr.) Kumm., Kohlen-Trichterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/177; CE 2/169; RH 271

Clitocybe splendens s. *Lepista flaccida* f. *gilva*

Clitocybe squamulosa (Pers.: Fr.) Kumm., Feinschuppiger Trichterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/169

Clitocybe suaveolens s. *C. fragrans*

Clitocybe subspadicea s. *C. umbilicata*

Clitocybe tenuissima s. *C. candicans*

Clitocybe umbilicata (Schaeff.: Fr.) Sing., Nabel-Trichterling

= *C. subspadicea* (J. Lge.) Bon et Chevassut; = *C. umbilicata* f. *subspadicea* (J. Lge.); = *Gerronema umbilicatum* (Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/178; C 2381 und 2762

Clitocybe vermicularis (Fr.) Quél., Lärchen-Trichterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/179; CE 2/171; RH 273

Clitocybe vibecina (Fr.: Fr.) Quél., Geriefter Mehltrichterling

=? *C. langei* Sing.; =? *C. pausiaca* (Fr.) Gill.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/180

***Clitopilus* (Fr.: Rabenh.) Kumm. (Entolomataceae)**

s. auch *Rhodocybe*

Clitopilus cretatus s. *C. scyphoides* var. *scyphoides*

Clitopilus hobsonii (Berk. et Br.) Ort.

= *C. pleurotelloides* (Kühn.) Joss.

Beleg: Mürlenbach 5805, L 1971 - Nachw.: KR 1B

Clitopilus intermedius s. *C. scyphoides* var. *intermedius*

Clitopilus pleurotelloides s. *C. hobsonii*

Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) Kumm., Mehrräsling

Beleg: Berlingen 5706, HA 1980; Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Paxillus p.*); KR 1B - Abb.: CE 2/573

Clitopilus scyphoides (Fr.) Sing. agg.

Nachw.: KR 1B

C. scyphoides var. *scyphoides*, Kreidiger Räsling

= *C. cretatus* (Berk. et Br.) Sacc.

Nachw.: EBERT, 1987; FRENCKEN, 1971/72 - Abb.: CE 2/575; C 2721 (als *C. omphaliformis*) und 2720 (Form mit kurzem Stiel); RH 374

C. scyphoides var. *intermedius* (Romagn.) Noord.

= *C. intermedius* Romagn.

***Collybia* (Fr.) Staude (Tricholomataceae)**

s. auch *Baeospora*, *Flammulina*, *Marasmius*, *Megacollybia*, *Microcollybia*, *Oudemansiella*, *Strobilurus* und *Xerula*

Collybia acervata (Fr.) Kumm., Büscheliger Rübbling

= *Marasmius acervatus* Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 320

Collybia alkalivirens Sing., Dunkelstieliger Rübbling

= *Marasmius obscurus* Fav.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/184; C 2383

Collybia bresadolae s. *C. marasmioides*

Collybia butyracea (Bull.: Fr.) Kumm. agg.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B

C. butyracea var. *butyracea*, Butter-Rübling

Beleg: Müllenborn 5705, Biol. Stat. Weijster - Nachw.: EBERT, 1987; FUCHS, 1993 - Abb.: BK 3/186; C 2387 (als *C. filamentosa*); CE 2/427 oben; RH 322

C. butyracea var. *asema* Fr., Horngrauer Rübling

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: BK 3/185; RH 323

Collybia cirrhata s. *Microcollybia* c.

Collybia confluens (Pers.: Fr.) Kumm., Knopfstieliger Rübling

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/187; RH 319

Collybia conigena s. *Baeospora myosura*

Collybia cookei s. *Microcollybia* c.

Collybia distorta (Fr.) Quél., Verdrehter Rübling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/188; CE 2/431

Collybia dryophila (Bull.: Fr.) Kumm. agg., Waldfreund-Rübling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B

C. dryophila var. *dryophila*

=? *C. dryophila* var. *aquosa* (Bull.: Fr.) Quél.

Abb.: BK 3/189; CE 2/423; RH 322

C. dryophila var. *funicularis* (Fr.) Karst., Gelbblättriger Rübling

= *C. exsculpta* (Fr.) Gill. ss. auct. [non ss. Romagn.]; = *C. luteifolia* Gill.

Abb.: BK 3/194; CE 2/425

C. dryophila var. *oedipus* Quél.

Bad Neuenahr, leg. et det. B. Oertel

Collybia exsculpta vgl. *C. dryophila* var. *funicularis*

Collybia fuscopurpurea (Pers.: Fr.) Kumm., Purpurbrauner Rübling

Beleg: Müllenborn 5705, Tj 1980 (als *C. konradiana*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/191; C 2385; RH 321

Collybia fusipes (Bull.: Fr.) Quél., Spindeliger Rübbling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/192; CE 2/429

Collybia hariolorum (DC.: Fr.) Quél., Striegeliger Rübbling

= *Marasmius h.* (Fr.)

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/193

Collybia maculata (Alb. et Schw.: Fr.) Kumm., Gefleckter Rübbling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/195; CE 2/431; RH 323

Collybia marasmioides (Britz.) Brsky. et Stangl, Rotstieliger Rübbling

= *Marasmius bresadolae* Kühn. et Romagn.

Beleg: Berlingen 5706, Tj 1980 (als *C. kuehneriana*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/196; CE 2/423; RH 320
(als *C. erythropus*)

Collybia mucida s. *Oudemansiella m.*

Collybia myriadophylla s. *Baeospora m.*

Collybia obscura s. *C. alkalivirens*

Collybia peronata (Bolt.: Fr.) Sing., Brennender Rübbling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Marasmius peronatus*); KR 1B - Abb.: BK 3/198; CE 2/419; RH 318

Collybia platyphylla s. *Megacollybia p.*

Collybia tuberosa s. *Microcollybia t.*

Conocybe Fay. (Bolbitiaceae)

Conocybe aporos Kits v. Wav., Frühlings-Glockenschüppling

= *C. blattaria* (Fr.) Kühn. ss. Kühn. et Romagn. pp.; = *Pholiotina a.* (Kits v. Wav.) Clém.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2230

Conocybe arrhenii (Fr.) Kits v. Wav.

= *C. blattaria* (Fr.) Kühn. ss. Kühn. et Romagn. pp.; = *Pholiotina a.* (Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1B

Conocybe blattaria (Fr.) Kühn., Krönchen-Glockenschüppling

(s. auch *C. aporos* und *C. arrhenii*)

= *C. togularis* ss. Kühn. et Romagn.; = *Pholiotina b.* (Fr.) Fay.

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 436

Conocybe brunneola Kühn. ex Kühn. et Watl.

Beleg: Gerolstein 5705, CH 1980 - Nachw.: KR 1B

Conocybe cryptocystis s. *C. subpubescens*

Conocybe kuehneriana s. *C. sienophylla*

Conocybe lactea (J. Lge.) Métz., Milchweißes Samthäubchen

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1750; RH 435

Conocybe macrocephala Kühn. ex Kühn. et Watl.

Beleg: Oos 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2217

Conocybe ochracea s. *C. sienophylla*

Conocybe pubescens (Gill.) Kühn., Mist-Samthäubchen

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/235

Conocybe rickeniana Sing. ex Ort., Flockenstieliges Samthäubchen

= *C. spicula* (Lasch: Fr.) Kumm. ss. Rick.

Beleg: Gerolstein 5705, CH 1980; Mürlenbach 5805, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2218; RH 436

Conocybe rickenii (J. Schff.) Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2648

Conocybe rubiginosa Watl.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2224

Conocybe sienophylla (Berk. et Br.) Sing.

= *C. ochracea* Kühn.; = *C. siennophila*; =? *C. kuehneriana* Sing.

Beleg: Gerolstein 5705, CH 1980; Reisrod b. Gees 5706, CH 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2651 und 2657
(*C. kuehneriana*)

Conocybe spicula s. *C. rickeniana*

Conocybe spiculoides Kühn. ex Kühn. et Watl.

Beleg: Berlingen 5706, CH 1980; Oos 5705, CH 1980 - Nachw.: KR 1B

Conocybe subovalis Kühn. ex Kühn. et Watl.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/233

Conocybe subpubescens Kühn. ex Ort.

= *C. cryptocystis* (Atk.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2222

Conocybe tenera (Schff.: Fr.) Fay., Roststieliges Samthäubchen

Nachw.: KR 1B

Conocybe teneroides (J. Lge.) Kits v. Wav.

= *Pholiotina t.* (J. Lge.) Sing.

Beleg: Oos 5705, CH 1980 (als *Pholiotina t.*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2231; CE 3/239

Conocybe togularis s. *C. blattaria*

***Coprinus* Pers.: S. F. Gray (Coprinaceae)**

Coprinus angulatus Peck, Kohlen-Tintling

= *C. boudieri* Quél.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/185

Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr. var. *atramentarius*, Knoten-Tintling

Beleg: Büscheich 5806, L 1971 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/169; RH 424

Coprinus atramentarius var. *acuminatus* Romagn., Gebuckelter Knoten-Tintling

Beleg: Büscheich 5806, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 424

Coprinus auricomus Pat.

Beleg: Gees 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1720

Coprinus boudieri s. *C. angulatus*

Coprinus brassicae s. *C. urticicola*

Coprinus callinus M. Lge. et A. H. Smith

Nachw.: KR 1B

Coprinus cinereus (Schaeff.: Fr.) S. F. Gray, Struppiger Tintling

= *C. macrocephalus* (Berk.) Berk.; = *C. macrorhizus* Pers.: Fr.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *C. fimetarius*); KR 1B - Abb.: C 2172 und 2173

Coprinus comatus (Muell.: Fr.) Pers., Schopftintling

= *C. comatus* var. *ovatus* (Schaeff.: Fr.)

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/165; RH 423

Coprinus cordisporus Gibbs

= *C. patouillardii* Quél.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2176

Coprinus cortinatus J. Lge.

Nachw.: KR 1B

Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray, Gesäter Tintling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: RH 427

Coprinus domesticus (Bolt.: Fr.) S. F. Gray, Haus-Tintling

=? *C. ellisii* Ort.

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: C 2171; RH 426

Coprinus echinosporus Bull.

= *C. giganteoporus* Huijism.

Nachw.: KR 1B

Coprinus ellisii s. *C. domesticus*

Coprinus ephemerus (Bull.: Fr.) Fr., Morgen-Tintling

Nachw.: KR 1B

Coprinus episcopalis Ort.

Nachw.: KR 1B

Coprinus flocculosus (DC.) Fr., Flockiger Tintling

Nachw.: KR 1B

Coprinus friesii Quél., Gras-Tintling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2609

Coprinus galericuliformis s. *C. leiocephalus*

Coprinus giganteoporus s. *C. echinosporus*

Coprinus gonophyllus Quéf.

Nachw.: KR 1B

Coprinus hemerobius s. *C. nudiceps*

Coprinus heptemerus J. Lge. et A. H. Smith

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2181

Coprinus impatiens (Fr.) Quéf., Graublättriger Tintling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2183

Coprinus lagopides Karst., Rundsporiger Brandstellen-Tintling

= *C. lagopus* (Fr.) Fr. var. *sphaerosporus* Kühn. et Joss.

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 425

Coprinus lagopus (Fr.) Fr., Hasenpfote

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1722

Coprinus lagopus var. *sphaerosporus* s. *C. lagopides*

Coprinus leiocephalus Ort.

=? *C. galericuliformis* Losa (??Watl.); = *C. plicatilis* (Curt.: Fr.) Fr. var. *microsporus* Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2184

Coprinus macrocephalus s. *C. cinereus*

Coprinus macrorhizus s. *C. cinereus*

Coprinus megaspermus Ort.

Beleg: Berlingen 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B

Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr., Glimmertintling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/179; RH 426

Coprinus miser Karst., Zarter Tintling

Nachw.: KR 1B (nur rechtsrheinische Funde?)

Coprinus narcoticus (Batsch: Fr.) Fr.

Nachw.: KR 1B

Coprinus niveus (Pers.: Fr.) Fr., Schneeweißer Tintling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/181; RH 427

Coprinus nudiceps Ort.

= *C. hemerobius* Fr.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/187

Coprinus patouillardii s. *C. cordisporus*

Coprinus pellucidus Karst.

Nachw.: KR 1B

Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) S. F. Gray, Specht-Tintling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/175; RH 425

Coprinus plicatilis (Curt.: Fr.) Fr., Glimmeriger Scheibchentintling

Beleg: Gerlostein 5705, PJ 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/185; RH 428

Coprinus plicatilis var. *microsporus* s. *C. leiocephalus*

Coprinus radians (Desm.: Fr.) Fr., Strahlfüßiger Tintling

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B

Coprinus silvaticus Peck, Rauhsporiger Tintling

Nachw.: KR 1B

Coprinus stercoreus (Scop.) Fr.

= *C. stercorarius* (Bull.) Fr. ss. Kühn. et Romagn.

Beleg: Gerolstein 5705, HA 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2180

Coprinus urticicola (Berk. et Br.) Bull., Kräuter-Tintling

= *C. brassicae* Peck

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1724

Coprinus velox God. ap. Gill.

Nachw.: KR 1B

Coprinus xanthothrix Romagn., Gelbschuppiger Tintling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2177

***Cortinarius* S. F. Gray emend. Fr. (Cortinariaceae)**

(die Arten der Gattung *Cortinarius* werden nach Untergattungen aufgelistet)

Cortinarius*, Untergattung *Cortinarius

Cortinarius (Cortinarius) violaceus (L.: Fr.) Fr., Dunkelvioletter Dickfuß

= *C. hercynicus* (Pers.) Mos.

Belege: leg. et det. B. Oertel 28.09.86, Meckenheim-Ersdorf; Moß b. Gerolstein, JG 1980 (als *C. hercynicus*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: C 2247; CE 3/455

***Cortinarius*, Untergattung *Dermocybe* (Fr.) Wünsche**

Cortinarius (Dermocybe) cinnabarinus s. *Cortinarius*, Untergattung *Telamonia*

Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeobadius s. *C. sommerfeltii*

Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeolutescens s. *C. croceus*

Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeoluteus Ort. ss. str.

(s. auch *C. croceus*)

= *Dermocybe saligna* Mos. et Kell.

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeus (L.: Fr.) Fr., Zimt-Hautkopf

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1971; Hinterhausen 5705, RIN 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/439

Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeus var. *lutescens* s. *C. croceus*

Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeus var. *paludosus* s. *C. palustris*

Cortinarius (Dermocybe) concinnus s. *C. uliginosus*

Cortinarius (Dermocybe) croceifolius s. *C. malicorius*

Cortinarius (Dermocybe) croceus Schaeff.: Fr., Gelbblättriger Hautkopf

= *Dermocybe cinnamomeolutea* (Ort.) Mos. ss. Mos. [non ss. Ort.]; = *C. cinnamomeolutescens* Hry.; = *C. cinnamomeus* (L.: Fr.) Fr. var. *lutescens* Gill.

Beleg: Gerolstein 5705, RIN 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/433

Cortinarius (Dermocybe) luteomarginatus s. *C. malicorius*

Cortinarius (Dermocybe) malicorius Fr., Orangegrüner Hautkopf

= *C. croceifolius* Peck; =? *Dermocybe luteomarginata* Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/437; RH 485

Cortinarius (Dermocybe) palustris (Mos.) Mos.

= *C. cinnamomeus* (L.: Fr.) Fr. var. *paludosus* Fr.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 31.08.86, Ormont - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/431

Cortinarius (Dermocybe) phoeniceus Bull.: Mre.

Beleg: Gees 5706, L 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B

Cortinarius (Dermocybe) puniceus s. *C. sanguineus*

Cortinarius (Dermocybe) salignus s. *C. cinnamomeoluteus*

Cortinarius (Dermocybe) sanguineus (Wulf.: Fr.) Fr., Blutroter Hautkopf

= *C. puniceus* Ort.

Beleg: leg. et det. B. Oertel und H. Straßfeld 1992, Forst Schmidtheim bei Oberschömbach, 5505, PE.... -
Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/447; RH 486

Cortinarius (Dermocybe) semisanguineus (Fr.) Mos., Blutblättriger Hautkopf

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/443; RH 486

Cortinarius (Dermocybe) sommerfeltii Hoiland

= *Dermocybe cinnamomeobadia* (Hry.) Mos. ss. Mos.

Beleg: Moß b. Gerolstein 5706, JF 1980; Gerolstein 5705, PJ 1980 (als *Dermocybe cinnamomeobadia*) -
Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Dermocybe) sphagneti s. *C. tubarius*

Cortinarius (Dermocybe) sphagnogenus s. *C. tubarius*

Cortinarius (Dermocybe) squamulosus (Batsch: Hry.) ??Autor

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Dermocybe) tubarius Ammirati et A. H. Smith

= *Dermocybe sphagneti* (Ort.) Mos.; = *Dermocybe sphagnogena* Mos.; = *Dermocybe vulcanica* Bon

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, Tj 1980 (als *Dermocybe sphagnogena*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2245

Cortinarius (Dermocybe) uliginosus Berk., Sumpf-Hautkopf

= *C. concinnus* Karst.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1773

Cortinarius (Dermocybe) vulcanicus s. *C. tubarius*

***Cortinarius*, Untergattung *Leprocybe* Mos.**

Cortinarius (Leprocybe) bolaris (Pers.: Fr.) Fr., Rotschuppiger Rauhkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/463; RH 490

Cortinarius (Leprocybe) callisteus (Fr.) Fr., Rhabarberfüßiger Rauhkopf

= *C. tophaceoides* Mos.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 02.10.87, Mürlenbach 5805; Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/477; RH 493

Cortinarius (Leprocybe) depexus s. *C. venetus*

Cortinarius (Leprocybe) gentilis (Fr.) Fr., Goldgelber Rauhkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/465; RH 492

Cortinarius (Leprocybe) humicola (Quél.) Mre., Kegeliges Rauhkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/471

Cortinarius (Leprocybe) orellanoides s. *C. rubellus*

Cortinarius (Leprocybe) orellanus (Fr.) Fr., Orangefuchsiges Rauhkopf

Beleg: leg. B. Krüssel 28.09.86, Blankenheim-Waldorf, det. B. Oertel, **Erstnachweis für die Eifel** - Abb.: CE 3/467; RH 490

Cortinarius (Leprocybe) raphanoides (Pers.: Fr.) Fr., Rettich-Rauhkopf

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Leprocybe) rubellus Cke., Spitzgebuckelter Rauhkopf

= *C. orellanoides* Hry.; = *C. speciosissimus* Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/469; RH 491

Cortinarius (Leprocybe) rubicundulus (Rea) Pears., Gilbender Rauhkopf

Beleg: leg. F. Benjaminsen und B. Oertel 02.10.87, Mürlenbach 5805, det. B. Oertel; Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/475; RH 489

Cortinarius (Leprocybe) saniosus (Fr.) Fr., Gelbfaseriger Rauhkopf

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2250; RH 492

Cortinarius (Leprocybe) speciosissimus s. *C. rubellus*

Cortinarius (Leprocybe) tophaceoides s. *C. callisteus*

Cortinarius (Leprocybe) venetus (Fr.: Fr.) Fr., Grüner Rauhkopf

=? *C. venetus* var. *montanus* Mos.; =? *C. depexus* Fr.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 31.10.87, Mürlenbach 5805, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/461; RH 489

***Cortinarius*, Untergattung *Myxacium* (Fr.) Kumm.**

Cortinarius (Myxacium) causticus Fr., Bereifter Schleimfuß

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/683

Cortinarius (Myxacium) collinitus s. *C. muscigenus*

Cortinarius (Myxacium) delibutus Fr., Blaublättriger Schleimfuß

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/675; RH 516

Cortinarius (Myxacium) elatior s. *C. lividochraceus*

Cortinarius (Myxacium) integerrimus s. *C. stillatitius*

Cortinarius (Myxacium) lividochraceus (Berk.) Berk., Langstieliger Schleimfuß

= *C. elatior* Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/673; RH 515

0 *Cortinarius (Myxacium) mucifluoides* s. *C. stillatitius*

0 *Cortinarius (Myxacium) mucifluus* ss. Rick. s. *C. stillatitius*

Cortinarius (Myxacium) mucosus (Bull.: Fr.) Fr., Heide-Schleimfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/671; RH 512

Cortinarius (Myxacium) muscigenus Peck, Blaustiel-Schleimfuß

= *C. collinitus* (Sow.: Fr.) Fr.

Beleg: Gees 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/669; RH 513

Cortinarius (Myxacium) pseudosalor s. *C. stillatitius*

Cortinarius (Myxacium) salor Fr. var. *salor*, Blauer Schleimfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/677; RH 516

Cortinarius (Myxacium) stillatitius Fr., Honig-Schleimfuß

= *C. integerrimus* Kühn.; = *C. mucifluoides* Hry.; = *C. mucifluus* Fr. ss. Rick.; = *C. pseudosalor* J. Lge.

Belege: leg. et det. B. Oertel und H. Straßfeld 1992, Marmagen, PE; Gees 5706, L 1980 (als *C. mucifluus*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: C 2288 und 2289; CE 3/669; RH 515

Cortinarius (Myxacium) trivialis J. Lge., Natternstieliger Schleimfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1776; CE 3/667; RH 513

Cortinarius (Myxacium) vibratilis (Fr.) Fr., Bitterster Schleimfuß

Beleg: Gerolstein 5706, JF 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/677

***Cortinarius*, Untergattung *Phlegmacium* (Fr.) Wünsche**

Cortinarius (Phlegmacium) alcalinophilus s. *C. eufulmineus*

Cortinarius (Phlegmacium) allutus Fr., Bereifter Schleimkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/489; RH 495 (als *C. multiformis*)

Cortinarius (Phlegmacium) amoenolens Hry. ex Ort., Buchen-Klumpfuß

= *C. cyanopus* (Secr.) Rick.

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/551; RH 498

Cortinarius (Phlegmacium) amurceus Fr.: Fr.

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Phlegmacium) arcuatorum Hry., Violettgesäumter Klumpfuß

=? *C. fulvoincarnatus* Joach.

Beleg: leg. F. Benjaminsen 02.10.87, Mürlenbach 5805, det. B. Oertel, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2259 (*C. fulvoincarnatus*)

Cortinarius (Phlegmacium) aurantioturbinatus J. Lge., Prächtiger Klumpfuß

= *C. auroturbinatus* Mos.; = *C. elegantissimus* Hry.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/615

Cortinarius (Phlegmacium) balteatoalbus Hry.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/589

Cortinarius (Phlegmacium) balteatus Fr.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 28.09.86, Meckenheim-Ersdorf, PE...., **Neufund für das Gebiet** - Abb.: CE 3/579

Cortinarius (Phlegmacium) boudieri Hry.

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: C 2273

Cortinarius (Phlegmacium) caesiocyaneus Britz.

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Phlegmacium) callochrous Fr. agg.

= *C. calochrous*

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B

C. callochrous var. *callochrous*

Beleg: leg. H. G. Fuchs und B. Oertel 18.09.94, Tondorf, det. B. Oertel - Abb.: C 1787

C. callochrous var. *caroli* (Vel.)

Abb.: C 2261

C. callochrous var. *coniferarum* Mos.

Abb.: C 2260

Cortinarius (Phlegmacium) cephalixus Fr., Körnigrauer Schleimkopf

Beleg: leg. et det. B. Oertel 03.10.87, Müllenborn; Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/527 und 529 (als *C. papulosus*)

Cortinarius (Phlegmacium) citrinus s. *C. pseudosulphureus*

Cortinarius (Phlegmacium) claroflavus Hry.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 22.10.89, Eschweiler - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1798 und (?)2286 (als *C. olivascentium* Hry.)

Cortinarius (Phlegmacium) cliduchus Fr., Gelbgeürtelter Schleimkopf

= *C. vitellinopes* (Secr.) Schröt.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/525

Cortinarius (Phlegmacium) coerulescens (Schaeff.) Fr. agg., Blauer Klumpfuß

(incl. *C. cyaneus* (Bres.) Mos.)

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (Löb-Standort in der Nähe von Bad Godesberg); KR 1B - Abb.: C 1793; CE 3/563

Cortinarius (Phlegmacium) crocolitus s. *C. triumphans*

Cortinarius (Phlegmacium) cyaneus s. *C. coerulescens* agg.

Cortinarius (Phlegmacium) cyanopus s. *C. amoenolens*

Cortinarius (Phlegmacium) dionysae Hry., Mehlgrüchender Klumpfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2270; CE 3/561

Cortinarius (Phlegmacium) elegantior Fr.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 02.10.87, Mürlenbach 5805, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/633

Cortinarius (Phlegmacium) elegantissimus s. *C. aurantioturbinatus*

Cortinarius (Phlegmacium) eufulmineus s. *C. fulmineus*

Cortinarius (Phlegmacium) flavovirens Hry., Gelbgrüner Klumpfuß

= *C. olivellus* Hry.

Beleg: leg. H. G. Fuchs und B. Oertel 18.09.94, Tondorf, det. B. Oertel, PE.... - Nachw.: KR 1B

0 *Cortinarius (Phlegmacium) fluryi* s. *C. vulpinus*

Cortinarius (Phlegmacium) fulgens ss. Lge. s. *C. subfulgens*

Cortinarius (Phlegmacium) fulmineus Fr., Fuchsiger Klumpfuß

=? *C. alcalinophilus* Hry.; = *C. eufulmineus* Hry.; =? *C. pseudofulmineus* Hry.

Beleg: leg. B. Oertel und H. Straßfeld 01.11.89, Eschweiler, bei Kiefern (!) auf Kalk, det. B. Oertel, PE....
- Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1803; CE 3/637; RH 506

Cortinarius (Phlegmacium) fulvoincarnatus s. *C. arcuatorum*

Cortinarius (Phlegmacium) fulvoochrascens Hry.

= *C. fuscomaculatus* J. Schff.; = *C. herpeticus* Fr. ss. Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/549

Cortinarius (Phlegmacium) fuscomaculatus s. *C. fulvoochrascens*

Cortinarius (Phlegmacium) glaucopus (Schaeff.: Fr.) Fr., Reihiger Klumpfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1790 und 2264; CE 3/545; RH 497

Cortinarius (Phlegmacium) herbarum Hry., Gras-Klumpfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/499

Cortinarius (Phlegmacium) herpeticus ss. Mos. s. *C. scaurus*

Cortinarius (Phlegmacium) herpeticus ss. Kühn. et Romagn. s. *C. fulvochrascens*

Cortinarius (Phlegmacium) inexpectatus Brandr.

=? *C. pseudonapus* Hry.

Beleg: leg. B. Oertel, H. Straßfeld und J. Strick 02.10.92, Mürtenbach 5805, det. B. Oertel, PE...., **Erstnachweis für die Eifel** - Abb.: C 2252 (*C. pseudonapus*)

Cortinarius (Phlegmacium) infractus (Pers.: Fr.) Fr., Bitterer Schleimkopf

Beleg: leg. Ebert 1986, Gerolstein, det. B. Oertel, PE....; leg. et det. B. Oertel 03.10.87, Müllenborn, PE....; Oos 5705, JG 1980; Müllenborn 5705, L 1980 (var. *olivellus*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (Löß-Standort in der Nähe von Bad Godesberg); KR 1B - Abb.: C 1795; CE 3/593; RH 501

Cortinarius (Phlegmacium) largus Fr., Blasser Schleimkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/569

Cortinarius (Phlegmacium) leochrous J. Schff., Löwengelber Klumpfuß

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Phlegmacium) lividoviolaceus (Hry. ex Mos.) Mos.

Beleg: Berlingen 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2276

Cortinarius (Phlegmacium) lustratus Fr.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 14.10.90, Mürtenbach 5805, PE...., **Neufund für die Eifel**

Cortinarius (Phlegmacium) multiformis (Fr.) Fr., Sägeblättriger Klumpfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/495 und 497 (var. *coniferarum*)

Cortinarius (Phlegmacium) nanceiensis Mre.

= *C. percomium* Hry.

Belege: leg. et det. B. Oertel 02.10.87, Mürtenbach 5805, PE....; leg. et det. T. Kuyper und B. Oertel 03.10.87, Müllenborn, PE - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/625

Cortinarius (Phlegmacium) nemorensis (Fr.) J. Lge., Verfärbender Schleimkopf

Beleg: leg. H. G. Fuchs und B. Oertel 18.09.94, Tondorf, det. B. Oertel - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/573; RH 500

Cortinarius (Phlegmacium) ochropallidus Hry., Ockerblasser Klumpfuß

Beleg: leg. et det. B. Oertel 23.09.88, Kottenforst bei Bonn-Röttgen, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/491

Cortinarius (Phlegmacium) odorifer Britz., Anis-Klumpfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/605; RH 504

Cortinarius (Phlegmacium) olivellus s. *C. flavovirens*

Cortinarius (Phlegmacium) percomis Fr., Würziger Schleimkopf

Beleg: Gerolstein 5706, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/629; RH 505

Cortinarius (Phlegmacium) percomium s. *C. nanceiensis*

Cortinarius (Phlegmacium) polychrous s. *C. scaurus*

Cortinarius (Phlegmacium) porphyropus Fr., Purpurfüßiger Schleimkopf

=? *C. subpurpurascens* (Batsch) Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/601; RH 502

Cortinarius (Phlegmacium) praestans (Corda) Gill., Schleiereule

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/557

Cortinarius (Phlegmacium) pseudofulmineus s. *C. fulmineus*

Cortinarius (Phlegmacium) pseudonapus s. *C. inexpectatus*

Cortinarius (Phlegmacium) pseudosulphureus Hry. ex Ort., Grünlings-Klumpfuß

= *C. citrinus* J. Lge. ex Ort.

Belege: leg. Ebert 1986, Gerolstein, det. B. Oertel, PE....; leg. N. Arnold 02.10.87, Mürlenbach 5805, det. B. Oertel, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1801

Cortinarius (Phlegmacium) purpurascens Fr., Purpurfleckender Klumpfuß

Beleg: leg. et det. B. Oertel 02.10.88, Salm; Reisrod b. Gees 5706, L 1980 (var. *largusoides*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/599; C 2279 (var. *largusoides*); RH 503

Cortinarius (Phlegmacium) rufoalbus s. *C. vulpinus*

Cortinarius (Phlegmacium) rufolivaceus Fr., Violettroter Klumpfuß

= *C. rufolivaceus* var. *pallidus* Mos.

Beleg: leg. H. G. Fuchs und B. Oertel 18.09.94, Tondorf, det. B. Oertel; Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/609 und 611; RH 505

Cortinarius (Phlegmacium) russeoides Mos., Stinkender Schleimkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/631

Cortinarius (Phlegmacium) scaurus Fr., Olivblättriger Klumpfuß

=? *C. herpeticus* Fr. ss. Mos. non ss. Kühn. et Romagn.; =? *C. polychrous* Hry.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 30.09.90, Birresborn, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/603 und C 2280 (beide als *C. herpeticus*) und 2281 (*C. herpeticus* var. *polychrous*); RH 503

Cortinarius (Phlegmacium) sebaceus Fr., Seidiger Schleimkopf

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: CE 3/501; RH 496

Cortinarius (Phlegmacium) sodagnitus Hry., Violetter Klumpfuß

Beleg: leg. H. G. Fuchs und B. Oertel 18.09.94, Tondorf, det. B. Oertel, PE....; leg. et det. B. Oertel 06.10.94, Weyer, PE....; **Neufunde für die Eifel** - Abb.: C 1791

Cortinarius (Phlegmacium) solitarius Hry.

(umstrittene Art; ähnlich *C. elegantior*)

Beleg: Pelm 5706, L 1980 - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81

Cortinarius (Phlegmacium) splendens Hry. var. *splendens*, Schöngelber Klumpfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/623

Cortinarius (Phlegmacium) subfulgens Ort.

= *C. fulgens* ss. Lge.

Lissendorf, leg. et det. H. Straßfeld; **Neufund für die Eifel** - Abb.: CE 3/635

Cortinarius (Phlegmacium) subpurpurascens s. *C. porphyropus*

Cortinarius (Phlegmacium) subtriumphans s. *C. subvalidus*

Cortinarius (Phlegmacium) subumbilicatus Hry., Kerblättriger Klumpfuß

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Phlegmacium) subvalidus Hry., Geschmückter Schleimkopf

= *C. subtriumphans* Hry. ss. Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2258 (var. *eriophorum* Mos.); RH 496

Cortinarius (Phlegmacium) talus Fr.

[nicht identisch mit *C. osmophorus* Ort.!]

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1980; zwischen Stroheich und Loogh 5706, leg. et det. B. Oertel - Nachw.: KR 1B (doppeldeutige Angaben; nicht von *C. osmophorus* getrennt) - Abb.: CE 3/493

Cortinarius (Phlegmacium) triumphans (Fr.) Fr., Gelbgestiefelter Klumpfuß

= *C. crocolitus* Quél.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1786; RH 497

Cortinarius (Phlegmacium) varicolor Fr. ss. Mos., Erdigriechender Schleimkopf

nach unseren Erfahrungen in der Eifel ohne erdigen Geruch (Varietät? Oder Form von *C. balteatus*?)

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/571; RH 499

Cortinarius (Phlegmacium) varius (Schaeff.: Fr.) Fr., Ziegelgelber Schleimkopf

Beleg: leg. et det. B. Oertel 31.10.87, Mürlenbach 5805, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/575; RH 499

Cortinarius (Phlegmacium) vitellinopes s. *C. cliduchus*

Cortinarius (Phlegmacium) vulpinus (Vel.) Hry.

= *C. fluryi* (Mos.) Mos.; = *C. rufoalbus* Kühn.

Belege: leg. et det. B. Oertel 31.10.87, Gees, PE....; leg. et det. B. Oertel 22.10.89, Eschweiler, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/513

***Cortinarius*, Untergattung *Sericeocybe* Ort.**

Cortinarius (Sericeocybe) alboviolaceus (Pers.: Fr.) Fr., Weißvioletter Dickfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/643; RH 510

Cortinarius (Sericeocybe) amethystinus s. *C. camphoratus*

Cortinarius (Sericeocybe) anomalus (Fr.: Fr.) Fr., Braunvioletter Dickfuß

=? *C. azureus* Fr.; =? *C. diabolicus* Fr.

Belege: leg. et det. B. Oertel 1992, Forst Schmidtheim bei Oberschömbach, 5505, PE; Oos 5705, JF 1980 (als *C. azureus*) - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/653 und 655 (als *C. azureus*); RH 511

Cortinarius (Sericeocybe) azureus s. *C. anomalus*

Cortinarius (Sericeocybe) camphoratus (Fr.) Fr., Bocks-Dickfuß

= *C. amethystinus* (Schaeff.) Quél.

Beleg: leg. et det. B. Oertel und H. Straßfeld 1992, Forst Schmidtheim bei Oberschömbach, 5505, PE
- Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/649; C 1806 (als *C. hircinus*); RH 508

Cortinarius (Sericeocybe) caninus (Fr.) Fr., Rostbrauner Dickfuß

Beleg: Gerolstein 5705, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/657

Cortinarius (Sericeocybe) decoloratus (Fr.: Fr.) Fr., Entfärbender Dickfuß

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Sericeocybe) diabolicus s. *C. anomalus*

Cortinarius (Sericeocybe) epsomiensis Ort.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 16.10.94, Dahlem, in einem Mesobrometum, keine Gehölze in der Nähe, PE....., **Erstnachweis für die Eifel**

Cortinarius (Sericeocybe) malachoides Ort.

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Sericeocybe) pholideus (Fr.: Fr.) Fr., Schuppiger Dickfuß

Beleg: Moß b. Gerolstein 5706, HA 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/659; RH 510

Cortinarius (Sericeocybe) spilomeus (Fr.: Fr.) Fr., Rotschuppiger Dickfuß

Beleg: leg. et det. B. Oertel 14.10.90, Mürtenbach 5805, PE....., **Neufund für die Eifel** - Abb.: CE 3/661

Cortinarius (Sericeocybe) tabularis ss. Mos. s. *C. viscidulus*

Cortinarius (Sericeocybe) traganus Fr., Safranfleischiger Dickfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/647; RH 508

Cortinarius (Sericeocybe) urbicus Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: ARNOLD 43

Cortinarius (Sericeocybe) violaceocinereus (Pers.: Fr.) Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2682

Cortinarius (Sericeocybe) viscidulus Mos., Flockiger Dickfuß

= *C. tabularis* (Bull.: Fr.) Fr. ss. Mos.

Beleg: Hinterhausen 5705, JG 1980 - Nachw.: KR 1B

***Cortinarius*, Untergattung *Telamonia* (Fr.) Wünsche**

(= Untergattung *Hydrocybe* (Fr.: Rabenh.) Wünsche)

Lit.: ARNOLD, 1993

Cortinarius (Telamonia) abietinus ??Autor

Beleg: leg. et det. N. Arnold 02.10.89, Rengen, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 60/89 - Nachw.: ARNOLD, 1993 - Abb.: ARNOLD 1

Cortinarius (Telamonia) acutus (Pers.: Fr.) Fr., Spitzer Wasserkopf

Beleg: leg. et det. B. Oertel 31.08.86, Ormont, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/763

Cortinarius (Telamonia) adalberti Fav.

Beleg: leg. E. Ludwig 04.10.89, Mückeln, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 71/89 - Nachw.: ARNOLD, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/749

Cortinarius (Telamonia) alnetorum (Vel.) Mos., Erlen-Gürtelfuß

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: ARNOLD 2; CE 3/759

Cortinarius (Telamonia) armeniacus (Schaeff.: Fr.) Fr., Aprikosen-Wasserkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: ARNOLD 4; CE 3/721; RH 519

Cortinarius (Telamonia) armillatus (Fr.) Fr., Geschmückter Gürtelfuß

Beleg: leg. et det. B. Oertel 31.08.86, Ormont, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/689; RH 517

Cortinarius (Telamonia) atrocoeruleus (Mos.) Mos.

Beleg: leg. et det. N. Arnold 04.10.89, Gerolstein, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 70/89 - Nachw.: ARNOLD, 1993; KR 1B - Abb.: ARNOLD 13; CE 3/757

Cortinarius (Telamonia) balaustinus (Fr.) Fr., Feuerblättriger Wasserkopf

Beleg: leg. et det. Arnold 28.09.87, Rengen, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 62/87 - Nachw.: ARNOLD, 1993 - Abb.: CE 3/743

Cortinarius (Telamonia) bibulus Quél., Violetter Erlen-Wasserkopf

= *C. pulchellus* J. Lge.

Beleg: leg. Swart-Velhuyzen 27.07.86, Schalkenmehrener Maar, det. P. B. Jansen, PE....; HA 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: ARNOLD 14; CE 3/735

Cortinarius (Telamonia) bivelus (Fr.: Fr.) Fr., Birken-Gürtelfuß

Beleg: leg. et det. N. Arnold 28.09.87, Rengen, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 64/87 - Nachw.: ARNOLD, 1993; KR 1B - Abb.: ARNOLD 7; C 2295; RH 519

Cortinarius (Telamonia) brunneofulvus s. *C. brunneus* f. *brunneus*

Cortinarius (Telamonia) brunneus (Pers.: Fr.) Fr. f. *brunneus*, Dunkelbrauner Gürtelfuß

= *C. brunneofulvus* Fr.

Beleg: leg. et det. Arnold 29.09.87 und 30.09.87, Rengen, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 62/87, 72/87 und 73/87 - Nachw.: ARNOLD, 1993; KR 1B - Abb.: C 2301; CE 3/747; RH 522

Cortinarius (Telamonia) brunneus f. *glandicolor* (Fr.)

= *C. glandicolor* Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: ARNOLD 8; CE 3/735

Cortinarius (Telamonia) bulliardi (Pers.: Fr.) Fr., Feuerfüßiger Gürtelfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/691

Cortinarius (Telamonia) calopus s. *C. laniger*

Cortinarius (Telamonia) candelaris s. *C. duracinus*

Cortinarius (Telamonia) casimiri (Vel.) Huijsm.

Beleg: Müllenborn 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Telamonia) castaneus (Bull.: Fr.) Fr., Kastanienbrauner Gürtelfuß

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Telamonia) cedriolens s. *C. parvannulatus*

Cortinarius (Telamonia) cinnabarinus Fr., Zinnoberroter Wasserkopf

= *Dermocybe cinnabarina* (Fr.) Wünsche

Beleg: leg. et det. N. Arnold 01.10.87, Mürlenbach 5805, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 162/87 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/449; RH 487

Cortinarius (Telamonia) colus Fr.

= *C. miniatopus* J. Lge.

Beleg: leg. Schreurs 25.09.87, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 77/87 - Nachw.: ARNOLD, 1993 - Abb.: C 1809 und 2685

Cortinarius (Telamonia) crassifolius (Vel.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/753

Cortinarius (Telamonia) damascenus Fr., Büscheliger Wasserkopf

(vgl. *C. vilior* Karst.)

Beleg: leg. et det. B. Oertel 07.10.90, Heisdorf, PE...., **Erstnachweis für die Eifel** - Abb.: C 2294

Cortinarius (Telamonia) decipiens (Pers.: Fr.) Fr., Schwarzgebuckelter Wasserkopf

Nachw.: KR 1B - Abb.: ARNOLD 19

Cortinarius (Telamonia) duracinus Fr., Spindeliger Wasserkopf

=? *C. candelaris* Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/705; C 2686 (var. *raphanicus*)

Cortinarius (Telamonia) fulvescens Fr.

Beleg: leg. et det. N. Arnold 30.09.87, Üdersdorf, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 71/87 - Nachw.: ARNOLD, 1993 - Abb.: ARNOLD 23 und 24; CE 3/765

Cortinarius (Telamonia) fuscopallens ??Autor

Beleg: leg. et det. N. Arnold 07.10.87, Üdersdorf, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 91/87 - Nachw.: ARNOLD, 1993

Cortinarius (Telamonia) glandicolor s. *C. brunneus* f. *glandicolor*

Cortinarius (Telamonia) helobius s. *C. romagnesii*

Cortinarius (Telamonia) helvelloides (Fr.) Fr.

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Telamonia) hemitrichus Fr., Weißflockiger Gürtelfuß

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Telamonia) hinnuleus (Sow.) Fr., Erdigriechender Gürtelfuß

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/739; RH 521

Cortinarius (Telamonia) impennis Fr., Büscheliger Gürtelfuß

Beleg: leg. et det. N. Arnold 30.09.87, Üdersdorf, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 74/87 - Nachw.: ARNOLD, 1993; KR 1B - Abb.: ARNOLD 12

Cortinarius (Telamonia) incisus (Pers.: Fr.) Fr., Zerrissener Gürtelfuß

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, Biol. Stat. Weijster - Nachw.: KR 1B - Abb.: ARNOLD 28; CE 3/761

Cortinarius (Telamonia) laniger Fr., Zimtrötlicher Gürtelfuß

= *C. calopus* Karst.

Beleg: leg. et det. N. Arnold 03.10.89, Gerolstein, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 69/89 - Nachw.: ARNOLD, 1993; KR 1B - Abb.: C 1815; CE 3/709; RH 518

Cortinarius (Telamonia) lucorum (Fr.) J. Lge., Hain-Gürtelfuß

Beleg: leg. et det. N. Arnold 02.10.89, Neunkirchen (Landkreis Daun), Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 62/89 - Nachw.: ARNOLD, 1993; KR 1B - Abb.: ARNOLD 30; RH 521

Cortinarius (Telamonia) melleopallens (Fr.) J. Lge.

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: CE 3/715

Cortinarius (Telamonia) miniatopus s. *C. colus*

Cortinarius (Telamonia) obtusus Fr., Jodoform-Wasserkopf

Belege: leg. et det. N. Arnold 30.09.87 und 08.10.87, Üdersdorf, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 66/87; A 152/87 - Nachw.: ARNOLD, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/765; RH 523

Cortinarius (Telamonia) paleaceus Fr., Duftender Gürtelfuß

=? *C. paleiferus* Svrc.

Belege: leg. et det. T. Kuyper und B. Oertel 03.10.87 (sowohl Frk. mit *paleaceus*- als auch solche mit *paleiferus*-Aspekt dicht nebeneinander), Müllenborn, PE; leg. et det. N. Arnold, als *C. flexipes*, 08.10.87, Rengen, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 86/87; Moß b. Gerolstein 5706, JF 1980 (als *C. paleiferus*) - Nachw.: ARNOLD, 1993; KR 1B - Abb.: ARNOLD 22, 32 und 37; CE 3/755; C 2302 (*C. paleiferus*); RH 522

Cortinarius (Telamonia) paleiferus s. *C. paleaceus*

Cortinarius (Telamonia) parvannulatus Kühn., Kleinberingter Gürtelfuß

=? *C. cedriolens* (Mos.) Mos.

Beleg: leg. et det. N. Arnold 04.10.89, Strohn, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 66/89 - Nachw.: ARNOLD, 1993; KR 1B - Abb.: C (?)1821

Cortinarius (Telamonia) privignoides Hry., Zwiebel-Wasserkopf

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, HA 1980 - Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Telamonia) pulchellus s. *C. bibulus*

Cortinarius (Telamonia) pulchripes Fav.

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Telamonia) romagnesii Hry.

=? *C. helobius* Romagn.

Beleg: Moß b. Gerolstein 5706, CH 1980 (als *C. helobius*) - Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Telamonia) saturninus Fr., Blaufleischiger Wasserkopf

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Telamonia) sertipes Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1817

Cortinarius (Telamonia) stemmatus (Fr.) Fr., Braunbeschleierter Gürtelfuß

Beleg: Gerolstein 5706, L 1980 - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81 - Abb.: C 2304 und ?1813 (*C. strobilaceus* Mos., identisch?)

Cortinarius (Telamonia) tiliaceus N. Arnold

Beleg: 04.10.89, Strohn, Inst. f. Botanik II, Univ. Regensburg, A 67/89 - Nachw.: ARNOLD, 1993 - Abb.: ARNOLD 35

Cortinarius (Telamonia) torvus (Bull.: Fr.) Fr., Wohlriechender Gürtelfuß

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/729; RH 520

Cortinarius (Telamonia) tubulipes Fav.

Nachw.: KR 1B

Cortinarius (Telamonia) uraceus (Fr.) Fr.

Beleg: Gees 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: ARNOLD 36 und 42; C 1820

Cortinarius (Telamonia) urbicus s. bei Untergattung *Sericeocybe*

***Crepidotus* (Fr.) Staude (Cortinariaceae)**

[incl. *Pleurotellus* Fayod 1889]

Crepidotus amygdalosporus s. *C. inhonestus*

Crepidotus applanatus (Pers.: Fr.) Kumm., Geriefter Krüppelfuß

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 - Abb.: C 1966

Crepidotus autochthonus J. Lge.

=? *C. caspari* Vel.; = *C. fragilis* Joss.

Nachw.: KR 1B

Crepidotus caspari s. *C. autochthonus*

Crepidotus cesatii (Rabh.) Sacc.

= *C. sphaerosporus* (Pat.) J. Lge.; =? *C. subepibryus* Pil.; = *C. subsphaerosporus* (J. Lge.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/325 und 327

Crepidotus fragilis s. *C. autochthonus*

Crepidotus haustellaris s. *Ramicola h.*

Crepidotus dishonestus Karst., Mandelsporiges Krüppelfüßchen

= *C. amygdalosporus* Kühn. in Kühn. et Romagn.; = *C. lundellii* Pil.; = *C. sambuci* Vel.; = *C. subtilis* Ort.; ?
= *C. velenovskyi* Pil.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1967; RH 468

Crepidotus lundellii s. *C. dishonestus*

Crepidotus luteolus (Lamb.) Sacc., Flaumiges Krüppelfüßchen

= *C. pubescens* Bres. ss. J. Lge.

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B

Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.) Staude, Gallertfleischiges Stummelfüßchen

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/325; RH 467

Crepidotus phillipsii s. *Melanotus p.*

Crepidotus pubescens s. *C. luteolus* und *C. versutus*

Crepidotus sambuci s. *C. dishonestus*

Crepidotus sphaerosporus s. *C. cesatii*

Crepidotus subepibryus s. *C. cesatii*

Crepidotus subsphaerosporus s. *C. cesatii*

Crepidotus subtilis s. *C. dishonestus*

Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) Kumm., Gemeines Stummelfüßchen

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/327

Crepidotus velenovskyi s. *C. dishonestus*

Crepidotus versutus Peck

= *C. pubescens* Bres. ss. auct.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2452

***Crinipellis* Pat. (Tricholomataceae)**

Crinipellis scabella (Alb. et Schw.: Fr.) Kuyp., Haarschwindling
= *C. corticalis* (Desm.) Sing. et Clém.; = *C. stipitaria* (Fr.) Pat.
Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1882; BK 3/204; RH 336

***Cystoderma* Fay. (Tricholomataceae)**

Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Fay., Amiant-Körnchenschirmling
Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: C 2168; CE 3/153; RH 420

Cystoderma amianthinum var. *longisporum* s. *C. jasonis*
Cystoderma aureum s. *Phaeolepiota a.*

Cystoderma carcharias (Pers.) Fay., Starkkriechender Körnchenschirmling
Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/153; RH 420

Cystoderma cinnabarinum s. *C. terrei*

Cystoderma fallax A. H. Smith et Sing.
Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/155

Cystoderma granulosum (Batsch: Fr.) Fay., Rostroter Körnchenschirmling
Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/151; RH 421

Cystoderma haematites s. *C. superbum*

Cystoderma jasonis (Cke. et Masee) Harm., Großsporiger Körnchenschirmling
= *C. longisporum* (Kühn.) Heinemann et Thoen; = *C. amianthinum* var. *longisporum* Kühn.
Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2604; RH 421

Cystoderma longisporum s. *C. jasonis*

Cystoderma superbum Huijss.
= *C. haematites* Berk. et Br. ss. Kühn. et Romagn.

(vgl. *Limacella vinosorubescens*)

Beleg: leg. B. Oertel 08.10.88, Sötenich 5405, det. T. Kuyper - Nachw.: KR 1B

Cystoderma terreii (Berk. et Br.) Harm., Zinnoberbrauner Körnchenschirmling
= *C. cinnabarinum* (Alb. et Schw.) Fay.
Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/157; RH 422

***Cystolepiota* Sing. ap. Sing. et Digilio (Agaricaceae)**
(z.T. bei *Lepiota* mit untergebracht)

Cystolepiota adulterina s. *C. hetieri*

Cystolepiota bucknallii (Berk. et Br.) Sing. et Clém., Stinkender Mehlschirmling
Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/91

Cystolepiota hetieri (Boud.) Sing., Trägerischer Mehlschirmling
= *C. adulterina* (Möll.) Bon

Beleg: Berlingen 5706, Tj 1980, det. G. de Vries - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/91 und 93; RH 411

Cystolepiota seminuda (Lasch) Kumm., Weißer Mehlschirmling
= *C. sistrata* (Fr.) Sing.; = *C. sororia* Huijism.

Belege: leg. et det. B. Oertel 06.09.86, Sötenich 5405, PE....; Berlingen 5706, Tj 1980, det. G. de Vries
(als *C. sistrata*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/93; RH 412

Cystolepiota sistrata s. *C. seminuda*
Cystolepiota sororia s. *C. seminuda*

***Delicatula* Fayod (Tricholomataceae)**
(s. auch *Hemimycena*)

Delicatula integrella (Pers.: Fr.) Fay., Weißer Adernabeling
Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Omphalia i.*); KR 1B - Abb.: BK 3/205; C 1884; RH 344

Dermocybe* s. *Cortinarius, Untergattung *Dermocybe*
Dermocybe cinnabarina s. *Cortinarius (Telamonia) cinnabarinus*

***Dermoloma* J. Lge.: Herink (Tricholomataceae)**

Dermoloma atrocinerum s. *D. cuneifolium*

Dermoloma cuneifolium (Fr.) Ort., Dunkelgrauer Samtrittlerling

= *D. atrocinerum* (Pers.: Pers.) Herink

Beleg: leg. et det. B. Oertel 04.11.89, Alendorf, PE....; leg. et det. B. Oertel 1994, Mürtenbach 5805, Erstnachweise für die Eifel - Abb.: BK 3/206; C 1928; CE 2/519; RH 365

Dermoloma josserandii Dennis et Ort.

Nachw.: EBERT, 1987

Drosophila s. *Lacrymaria* und *Psathyrella*

Dryophila s. *Kuehneromyces* und *Pholiota*

***Entoloma* (Fr.) Kumm. emend. Donk (Entolomataceae)**

= *Rhodophyllus* Quél.

Entoloma albotomentosum Noord. et Hausknecht

Nachw.: KR 1B

Entoloma ameides (Berk. et Br.) Sacc.

= *E. sacchariolens* (Romagn.) Noord.

Beleg: leg. B. Oertel und F. Speckenbach 31.08.86, Pesch: Hardt, det. B. Oertel, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/533

Entoloma araneosum (Quél.) Mos., Silberfaseriger Rötling

=? *E. fulvostrigosum* (Berk. et Br.) Noord.

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 386

Entoloma ardosiacum s. *E. mougeotii*

Entoloma atromarginatum (Romagn. et Fav.) Zschie.

=? *Rhodophyllus caliginosus* Romagn. et Fav.

Nachw.: KR 1B

Entoloma bloxamii (Berk. et Br.) Sacc., Blauer Rötling

= *E. madidum* (Fr.: Fr.) Gill.

Nachw.: KR 1B; Mürtenbach 5805, leg. et det. B. Oertel - Abb.: CE 2/529

Entoloma byssisedum (Pers.: Fr.) Donk, Stummelfuß-Rötling

Beleg: Gerolstein 5705, JF 1980; Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1868; RH 386

Entoloma caccabus (Kühn.) Noord.

Nachw.: KR 1B

Entoloma caliginosum s. *E. atromarginatum*

Entoloma cetratum (Fr.) Mos., Scherbengelber Rötling

=? *E. cuneatum* (Bres.) Mos.; = *E. lanuginosipes* Noord.; = *E. pallescens* (P. Karst.) Noord.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/561; RH 384

Entoloma chalybaeum (Pers.: Fr.) Noord. agg., Schwarzblauer Rötling

Nachw.: KR 1B

E. chalybaeum var. *chalybaeum*

Abb.: C 2729

E. chalybaeum var. *lazulinum* (Fr.) Noord., Schwarzblauer Rötling

= *Rhodophyllus lazulinus* (Fr.) Quél.

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81 - Abb.: CE 2/555; RH 383

Entoloma chloropolium vgl. *E. exile*

Entoloma clypeatum (L.: Fr.) Kumm., Schild-Rötling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B

Entoloma conferendum (Britz.) Noord., Kreuzsporiger Glöckling

= *Rhodophyllus rickenii* Romagn.; = *Rhodophyllus stauosporus* (Bres.) J. Lge.; = *Rhodophyllus stauosporus* var. *rickenii* (Romagn.); =? *Rhodophyllus xylophilus* J. Lge.

Beleg: leg. W. Luck, B. Oertel, J. Strick und Tüttenberg 14.08.94, Blankenheim-Waldorf, det. B. Oertel, winzige Form, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/561

Entoloma cordae s. *E. turbidum*

Entoloma costatum (Fr.) Kumm., Geripptblättriger Rötling

Nachw.: KR 1B

Entoloma cucullatum s. *E. vernum*

Entoloma cuneatum s. *E. cetratum*

Entoloma cyanulum (Lasch: Fr.) Noord.

Nachw.: KR 1B

Entoloma dichroum (Pers.: Fr.) Kumm. ss. str.

Nachw.: KR 1B

Entoloma euchroum (Pers.: Fr.) Donk, Violetter Rötling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1863

Entoloma eulivium s. *E. sinuatum*

Entoloma excentricum Bres., Marmorierter Rötling

Beleg: Gerostein 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/529; RH 376

Entoloma exile (Fr.: Fr.) Hesl. agg.?

vgl. *E. pyrospilum* (Ort.) Noord. und *E. chloropolium* (Fr.) Mos., ungeklärte Verwandtschaftsverhältnisse

Nachw.: KR 1B

Entoloma farinogustus Arn. et Noord.

Nachw.: KR 1B

Entoloma formosum s. *E. xanthochroum*

Entoloma fulvostrigosum s. *E. araneosum*

Entoloma griseocyaneum (Fr.) Kumm., Flockenschuppiger Rötling

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1865 und 2327; RH 382

Entoloma hebes (Romagn.) Trimbach

= *E. leptopus* Noord.; = *Rhodophyllus mammosus* (L.) Quéél. var. *tenuis* (Fr.) Kühn. et Romagn.;
= *Rhodophyllus mammosus* (L.) Quéél. var. *obsoletus* Romagn.

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 (als *E. leptopus*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2333

Entoloma hirtipes (Schum.: Fr.) Mos., Gebrechlicher Glöckling

= *Rhodophyllus mammosus* (L.) Quéél. ss. Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/563 und 565; RH 385

Entoloma icterinum s. *E. pleopodium*

Entoloma incanum (Fr.) Hesl., Braungrüner Rötling

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, JG 1980; Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/551; RH 380

Entoloma infula (Fr.) Noord.

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2328 und 2731

Entoloma inopiliforme s. *E. prunuloides*

Entoloma jubatum (Fr.) Karst., Rußblättriger Rötling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/531

Entoloma juncinum (Kühn. et Romagn.) Noord.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2329

Entoloma juniperinum Barkm. et Noord.

Nachw.: KR 1B

Entoloma lampropus (Fr.: Fr.) Hesl. [non ss. Lge.]

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1864

Entoloma lanuginosipes s. *E. cetratus*

Entoloma lazulinum s. *E. chalybaeum* var. *lazulinum*

Entoloma leptopus s. *E. hebes*

Entoloma lividoalbum (Kühn. et Romagn.) Kubicka

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/549

Entoloma lividum s. *E. sinuatum*

Entoloma longistriatum (Peck) Noord. agg.

Nachw.: KR 1B

E. longistriatum (Peck) Noord. var. *longistriatum*

= *E. sarcitulum* (Kühn. et Romagn. ex Ort.) Arn.

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 (als *E. sarcitulum*) - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81 - Abb.: C 2323

E. longistriatum var. *majusculum* (Kühn. et Romagn.) Noord.

E. longistriatum var. *spurcifolium* Kühn.

= *E. sarcitulum* (Kühn. et Romagn. ex Ort.) Arn. var. *spurcifolium* Kühn.

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 (als *E. sarcitulum* var. *spurcifolium*) - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81

Entoloma lucidum (Ort.) Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2732

Entoloma madidum s. *E. bloxamii*

Entoloma mammosus s. *E. hirtipes*

Entoloma mammosus var. *obsoletus* s. *E. hebes*

Entoloma mammosus var. *tenuis* s. *E. hebes*

Entoloma mougeotii (Quél.) Hesl., Schiefergrauer Rötling

= *Rhodophyllus ardosiacus* (Bull.) ?? Autor ss. Quél.

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/557 und 559 (var. *incarnatus* Mos.); RH 384

Entoloma myrmecophilum (Romagn.) Mos.

=? *Rhodophyllus platyphylloides* Romagn.

Nachw.: KR 1B

Entoloma nidorosum s. *E. rhodopolium* f. *nidorosum*

Entoloma niphoides s. *E. saepium*

Entoloma nitens (Vel.) Noord.

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1866

Entoloma nitidum Quél., Stahlblauer Rötling

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 376

Entoloma pallescens s. *E. cetratus*

Entoloma papillatum (Bres.) Dennis

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B

Entoloma phaeocyathus Noord.

Nachw.: KR 1B

Entoloma platyphylloides s. *myrmecophilum*

Entoloma pleopodium (Bull.: Fr.) Noord., Zitronengelber Glöckling

= *E. icterinum* (Fr.) Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/559

Entoloma politum (Fr.) Donk

Beleg: Hinterhausen 5705, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2334

Entoloma porphyrophaeum (Fr.) Karst., Porphybrauner Rötling

Nachw.: KR 1B

Entoloma prunuloides (Fr.: Fr.) Quél.

= *E. inopiliforme* Bon

Nachw.: KR 1B

Entoloma pyrospilum vgl. *E. exile*

Entoloma rhodocylix (Lasch: Fr.) Mos., Erlen-Nabelrötling

Beleg: Moß b. Gerolstein 5706, RS 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1869

Entoloma rhodopolium (Fr.) Kumm. agg.

Nachw.: KR 1B

E. rhodopolium f. *rhodopolium*, Niedergedrückter Rötling

Nachw.: EBERT, 1987; Heisdorf, leg. et det. B. Oertel

E. rhodopolium f. *nidorosum* (Fr.) Noord., Alkalischer Rötling

= *E. nidorosum* (Fr.) Quél.

Nachw.: EBERT, 1987; Mürlenbach 5805, leg. et det. B. Oertel - Abb.: RH 379

Entoloma rickenii s. *E. conferendum*

Entoloma sacchariolens s. *E. ameides*

Entoloma saepium (Noul.-Das.) Richon et Roze

= *E. sepium*; =? *E. niphoides* (Romagn.) Ort.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/537 und 531 (*E. niphoides*)

Entoloma sarcitulum s. *E. longistriatum* var. *longistriatum*

Entoloma sericatum (Britz.) Sacc.

Nachw.: KR 1B

Entoloma sericellum (Bull.: Fr.) Kumm., Weißer Zärtling

Beleg: Müllenborn 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1859; RH 380

Entoloma sericeonitidum s. *E. undatum*

Entoloma sericeum (Bull.: Mér.) Quél., Seidiger Rötling

= *Rhodophyllus sericeus* (Bull.: Fr.) var. *nolaniformis* Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/535; C 2726 (var. *cinereoopacum*)

Entoloma serrulatum (Pers.: Fr.) Hesl., Gesägtblättriger Zärtling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/553; RH 383

Entoloma sinuatum (Bull.: Fr.) Kumm., Riesen-Rötling

= *E. eulividum* Noord.; = *E. lividum* (Bull.) Quél.

Beleg: Gindorf 5905, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 375

Entoloma sordidulum (Kühn. et Romagn.) Ort.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2320

Entoloma staurosporum s. *E. conferendum*

Entoloma turbidum (Fr.) Quél., Geradrandiger Rötling

= *Rhodophyllus cordae* (Karst.) J. Lge.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/533; RH 377

Entoloma undatum (Fr.) Mos., Dunkelblättriger Rötling

= *E. sericeonitidum* (Ort.) Noord.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1870; RH 387

Entoloma vernum Lund., Frühlings-Rötling

= *Rhodophyllus cucullatus* Fav.

Nachw.: FUCHS, 1993 (**Erstnachweis für die Eifel**) - Abb.: RH 377

Entoloma versatile (Fr.) Mos., Olivbrauner Rötling

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 385

Entoloma whiteae s. *E. xanthochroum*

Entoloma xanthochroum (Ort.) Noord.

= *Rhodophyllus formosus* (Fr.) Quél. ss. Kühn. et Romagn.; = *E. whiteae* (Murr.) Heim et Romagn.

Nachw.: KR 1B

Entoloma xylophilum s. *E. conferendum*

Faerberia Pouz. (Polyporaceae)

= *Geopetalum* Pat. emend. Sing.

Faerberia carbonaria (Alb. et Schw.: Pers.) Pouz., Kohlenleistling

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 3/207; CE 1/431

Fayodia Kühn. (Tricholomataceae)

s. auch *Myxomphalia*

Fayodia bisphaerigera s. *F. gracilipes*

Fayodia clusilis s. *F. pseudoclusilis*

Fayodia gracilipes (Britz.) Brsky. et Stgl., Ranziger Rußnabeling

= *F. bisphaerigera* (J. Lge.) Kühn.; = *Omphalia bisphaerigera* J. Lge.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/208

Fayodia pseudoclusilis (Joss. et Konr.) Sing., Winter-Rußnabeling

= *Omphalia clusilis* (Fr.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/209; C 2399

Flammulaster Earle (Strophariaceae)

(z.T. zu *Naucoria* gestellt)

Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle agg.

Nachw.: KR 1B

F. carpophilus var. *carpophilus*, Buchenwald-Schnitzling

Abb.: C 1757; RH 463

F. carpophilus var. *rhombosporus* (Atk.) Vellinga

=? *F. fusisporus* Ort.; = *F. rhombosporus* (Atk.) Watl.; = *Naucoria rhombospora* Atk.

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1980 (*F. rhombosporus*) - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81

F. carpophilus var. *subincarnatus* (Joss. et Kühn.) Vellinga

= *F. subincarnatus* (Jos. et Kühn.) Watl.; = *Naucoria subincarnata* Joss. et Kühn.

Nachw.: KR 1B

Flammulaster ferrugineus (Mre.) Watl.

= *Naucoria ferruginea* Mre.; =? *F. siparius* (Fr.) Watl.; =? *Naucoria siparia*

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2661

Flammulaster fusisporus s. *F. carpophilus* var. *rhombosporus*

Flammulaster limulatus (Weinm.: Fr.) Watl., Gelbblättriger Flockenschüppling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/319; RH 463

Flammulaster rhombosporus s. *F. carpophilus* var. *rhombosporus*

Flammulaster siparius s. *F. ferrugineus*

Flammulaster subincarnatus s. *F. carpophilus* var. *subincarnatus*

Flammulaster wieslandri (Fr.) Mos. (non ss. Kühn. et Romagn.)

Nachw.: KR 1B

***Flammulina* Karst. (Tricholomataceae)**

(z.T. mit zu *Collybia* gestellt)

Flammulina fennae Bas, Wurzelnder Samtfußrübbling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2766

Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Karst., Gemeiner Samtfußrübbling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/210; CE 2/525; RH 370

Galera* s. *Galerina

***Galerina* Earle (Cortinariaceae)**

= *Galera* Fr.; s. auch *Phaeogalera*

Galerina allospora A. H. Smith et Sing.

Beleg: Müllenborn 5705, CH 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2644

Galerina atkinsoniana s. *G. vittiformis* var. *atkinsoniana*

Galerina autumnalis (Peck) A. H. Smith et Sing.

Beleg: Gindorf 5905, CH 1980, det. A. Jansen - Nachw.: KR 1B

Galerina badipes (Fr.) Kühn.

Nachw.: KR 1B

Galerina calyptrata Ort.

Nachw.: KR 1B

Galerina camerina (Fr.) Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2647

Galerina cedretorum Mre.

Beleg: Gerolstein 5705, CH 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2642

Galerina cerina A. H. Smith et Sing.

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, CH 1980 (und var. *longicystis*) - Nachw.: KR 1B

Galerina clavata (Vel.) Kühn., Großsporiger Häubling

= *G. heterocystis* (Atk.) A. H. Smith et Sing.

Belege: Remagen 5409, leg. et det. B. Oertel 31.10.92, PE....; Oos 5705, CH 1980 (als *G. heterocystis*); Berlingen 5706, CH 1980 (als *G. heterocystis*); Gerolstein 5706, CH 1980 (als *G. heterocystis*) - Nachw.: KR 1B

Galerina gibbosa Fav.

Nachw.: KR 1B

Galerina graminea s. *G. laevis*

Galerina heterocystis s. *G. clavata*

Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Kühn., Moos-Häubling

Nachw.: KR 1B

Galerina laevis (Pers.) Sing., Rasen-Häubling

= *G. graminea* (Vel.) Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2639; RH 526

Galerina marginata (Batsch) Kühn., Gift-Häubling

=? *G. unicolor* (Vahl) Sing.

Beleg: Gerolstein 5705, CH 1980; Oos 5705, CH 1980; Berlingen 5706, CH 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/777; C (?)2641 (als *G. unicolor*); RH 527

Galerina mniophila (Lasch: Fr.) Kühn., Braungeriefter Häubling

Nachw.: KR 1B

Galerina muricellospora s. *G. vittiformis* var. *vittiformis*

Galerina mycenopsis s. *G. pumila*

Galerina paludosa (Fr.) Kühn., Weißflockiger Häubling

Beleg: leg. et det. B. Oertel 27.07.86, Mosbruch, 5707, PE....; leg. et det. B. Oertel 09.08.86, Blankenheim-Nonnenbach, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/779; RH 525

Galerina pumila (Pers.: Fr.) J. Lge. ex Sing.

= *G. mycenopsis* ss. Rick.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1739

Galerina rubiginosa s. *G. vittiformis* var. *vittiformis*

Galerina sideroides (Fr.) Kühn. var. *sideroides* [non ss. Kühn.], Glimmerstieliger Häubling

Beleg: Büscheich 5806, L 1971 - Nachw.: KR 1B

Galerina sideroides (Fr.) var. *stylifera* (Atk.) Krglst., Schmieriger Häubling

= *G. sideroides* ss. Kühn., ss. Rick.; = *G. stylifera* (Atk.) A. H. Smith et Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1737; RH 527

Galerina sphagnum (Pers.: Fr.) Kühn., Sumpf-Häubling

Nachw.: KR 1B

Galerina stylifera s. *G. sideroides* var. *stylifera*

Galerina subcerina A. H. Smith et Sing.

Beleg: Gerolstein 5706, CH 1980; Moß b. Gerolstein, CH 1980 - Nachw.: KR 1B

Galerina tibiicystis (Atk.) Kühn., Bereifter Häubling

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 526

Galerina triscopa (Fr.) Kühn., Spitzhütiger Häubling

Beleg: Gerolstein 5706, CH 1980; Gerolstein 5706, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1736; RH 528

Galerina unicolor s. *G. marginata*

Galerina vinolenta (Berk.) A. H. Smith et Sing.

Nachw.: KR 1B

Galerina vittiformis (Fr.) Sing. var. *vittiformis*

= *G. muricellospora* Atk.; = *G. rubiginosa* (Pers.: Fr.) Kühn. ss. Kühn.; = *G. vittaeformis*

Beleg: Berlingen 5706, CH 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1738

Galerina vittiformis var. *atkinsoniana* (A. H. Smith) Krglst.

= *G. atkinsoniana* A. H. Smith

Beleg: Gerolstein 5705, CH 1980 (als *G. atkinsoniana*); Gerolstein 5706, CH 1980 (als *G. atkinsoniana*) -
Nachw.: KR 1B

Geopetalum s. *Faerberia*, *Hohenbuehelia* und *Resupinatus*

Geophila s. *Hypholoma*, *Melanotus*, *Phaeogalera medullosa*, *Psilocybe* und *Stropharia*

Gerronema s. *Clitocybe umbilicata*, *Omphalina* und *Phytonconis*

***Gloiocephala* Mass. (Tricholomataceae)**

keine Nachweise aus der Eifel

***Gomphidius* s. bei den Röhrlingen und Verwandten**

***Gymnopilus* Karst. (Cortinariaceae)**

Gymnopilus hybridus s. *G. penetrans* var. *penetrans*

Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murr. var. *penetrans*, Geflecktblättriger Flämmling

= *G. hybridus* (Fr.: Fr.) Sing.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Flammula hybrida*); FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: C 1759; CE 3/425; RH 484

Gymnopilus sapineus (Fr.) Mre., Tannen-Flämmling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Flammula sapinea*); KR 1B

Gymnopilus spectabilis (Fr.) Sing., Beringter Flämmling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/427; C 2669 (als var. *junonius*); RH 482

***Hebeloma* (Fr.) Kumm. (Cortinariaceae)**

Hebeloma circinans Quél., Elfenring-Fälbling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/417

Hebeloma clavulipes Romagn.

Nachw.: KR 1B

Hebeloma crustuliniforme (Bull.: Fr.) Quél., Tongrauer Fälbling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: RH 479

Hebeloma edurum s. *H. senescens*

Hebeloma fastibile (Pers.: Fr.) Kumm. ss. J. Lge., Büscheliger Fälbling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/401

Hebeloma hiemale Bres., Winter-Fälbling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958

Hebeloma latifolium s. *H. sacchariolens* var. *palliduluctuosum*

Hebeloma longicaudum (Pers.: Fr.) Kumm. ss. J. Lge., Langstieliger Fälbling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/405

Hebeloma mesophaeum (Pers.: Fr.) Quél., Dunkelscheibiger Fälbling

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/395; RH 478

Hebeloma pusillum J. Lge., Winziger Fälbling

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: C 1769

Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Rick., Wurzelnder Marzipan-Fälbling

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, Biol. Stat. Weijster 1980; Reisrod b. Gees 5706, L 1971 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/393

Hebeloma sacchariolens Quél. var. *sacchariolens*, Süßriechender Fälbling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/419; RH 480

Hebeloma sacchariolens var. *palliduluctuosum* (Grög. et Zschie.) Quad.

= *H. latifolium* Grög. et Zschie.

Nachw.: KR 1B

Hebeloma sacchariolens var. *tomentosum* Mos.

= *H. tomentosum* (Mos.) Grög. et Zschie.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1771

Hebeloma sarcophyllum (Peck) Sacc.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1767

Hebeloma senescens (Batsch) Berk. et Br.

= *H. edurum* Métr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2673; CE 3/415

Hebeloma sinapizans (Paul.: Fr.) Gill., Großer Rettich-Fälbling

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, Biol. Stat. Weijster 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb. CE 3/413; RH 479

Hebeloma strophosum (Fr.) Sacc.

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/397

Hebeloma tomentosum s. *H. sacchariolens* var. *tomentosum*

Hebeloma truncatum (Schaeff.: Fr.) Kumm., Kakao-Fälbling

Nachw.: EBERT, 1987

Hebeloma vaccinum Romagn., Dunkelbrauner Fälbling

Nachw.: KR 1B

***Hemimycena* (Sing.) Sing. (Tricholomataceae)**

(z.T. bei *Delicatula* oder *Mycena* mit untergebracht)

Hemimycena cucullata (Pers.: Fr.) Sing., Gipsweißer Scheinhelmling

= *Mycena gypsea* Fr. ss. Ricken

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/216; C 2349

Hemimycena delectabilis (Peck) Sing.

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B

Hemimycena delicatella s. *H. lactea*

Hemimycena gracilis s. *H. pithya*

Hemimycena gypsea s. *H. cucullata*

Hemimycena lactea (Pers.: Fr.) Sing., Milchweißer Scheinhelmling

= *H. delicatella* (Peck) Sing.

Beleg: Gerolstein 5705, JF 1980 (als *H. delicatella*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/217; C 1885

Hemimycena pithya (Fr.) Dörf., Nadel-Scheinhelmling

= *H. gracilis* (Quél.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/219; C 1886

Hohenbuehelia Schulz. (Tricholomataceae)

(= *Geopetalum* Pat. pp.)

Hohenbuehelia algida s. *H. atrocoerulea*

Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.: Fr.) Sing., Blaugrauer Muscheling

= *Geopetalum algidum* (Fr.) ss. Kühn. et Romagn.

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/222; vgl. C 2803 (*H. grisea*); CE 2/445

Hohenbuehelia geogenia (DC.: Fr.) Sing., Erd-Muschelling

Steinfeld, leg. et det. B. Oertel, **Erstnachweis für die Eifel** - Abb.: BK 3/223; C 1965

Hohenbuehelia petaloides (Bull.: Fr.) Schulz., Spatelförmiger Muscheling

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 338

Hohenbuehelia rickenii (Kühn.) Ort., Nadelholz-Muscheling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/441

Hydropus Kühn.: Sing. (Tricholomataceae)

(z.T. mit bei *Mycena* untergebracht)

Hydropus paradoxus Mos.

Beleg: Oos 5705, CH 1980; Reisrod b. Gees 5706, L 1980 - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81

Hydropus subalpinus (v. Höhn.) Sing., Buchenwald-Wasserfuß

Beleg: leg. et det. B. Oertel 23.06.91, Niederrissen, 5509, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/517; RH 365

***Hygrocybe* (Fr.) Kumm. (Tricholomataceae)**

(z.T. mit *Hygrophorus* in eine Gattung gestellt)

Hygrocybe acutoconica s. *H. persistens*

Hygrocybe aurantiosplendens Hall., Glänzender Orange-Saftling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/121

Hygrocybe cantharellus s. *H. lepida*

Hygrocybe chlorophana (Fr.: Fr.) Wünsche, Stumpfer Saftling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/81; C 2436; RH 253

Hygrocybe citrina (Rea) J. Lge., Zitronengelber Saftling

Beleg: Gerolstein 5705, Tj 1980 (als *Hygrophorus citrinus*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/82

Hygrocybe coccinea (Schaeff.: Fr.) Kumm., Kirschroter Saftling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/83; CE 2/125; RH 256

Hygrocybe coccineocrenata (Ort.) Mos., Schuppiger Moor-Saftling

= *Hygrophorus turundus* Fr. ss. Kühn. et Romagn.; = *H. turunda* (Fr.: Fr.) Karst. var. *sphagnophila* (?? Peck) ??Bon

Beleg: leg. et det. B. Oertel 31.08.86, Ormont - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/101

Hygrocybe conica (Schaeff.: Fr.) Kumm. var. *conica*, Schwärzender Saftling

= *H. nigrescens* (Quél.) Kühn.; = *H. riparia* Kreis.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 29.06.87, Heiligenstein bei Gerolstein, PE.... - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; JAAP, 1910; KR 1B - Abb.: BK 3/85; CE 2/105 und 107; RH 254

Hygrocybe conica var. *chloroides* (Mal.) Bon

= *H. olivaceonigra* (Ort.) Mos.; = *H. tristis* (Pers.) Möll.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2439; CE 2/103

Hygrocybe crocea s. *H. persistens*

Hygrocybe cystidiata Arn.

= *H. obrussea* (Fr.) Wünsche ss. Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C (?)1961

Hygrocybe fornicata (Fr.) Sing., Blaßbrandiger Saftling

=? *H. streptopus* (Fr.) Sing. et Kuthan

Beleg: Dollendorf 5606, leg. et det. B. Oertel 14.11.92, in einem Gentiano-Koelerietum, **Erstnachweis für die Eifel** - Abb.: RH 252 (*H. streptopus*)

Hygrocybe helobia (Arn.) Bon, Sumpf-Saftling

= *H. mollis* Berk. et Br. ss. Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/87; CE 2/135

Hygrocybe insipida (J. Lge. ex Lund.) Mos., Gelbrandiger Saftling

= *Hygrophorus reai* (Mre.) J. Lge. var. *insipidus* J. Lge.

Nachw.: KR 1B

Hygrocybe intermedia (Pass.) Fay., Trockener Saftling

Nachw.: KR 1B

Hygrocybe konradii Hall.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1955

Hygrocybe laeta (Pers.: Fr.) Kumm., Zäher Saftling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/89; CE 2/97; RH 254

Hygrocybe lepida Arn., Trichterförmiger Saftling

= *H. cantharellus* (Schw.: Fr.) Murr.

Beleg: leg. W. Luck, B. Oertel, M. Schröder und Tüttenberg 14.08.94, Blankenheim-

Waldorf, Heidemoor auf dem Heidekopf III, in Gesellschaft von *Geoglossum simile*, PE...., **Erstnachweis für die Eifel** - Abb.: BK 3/90; CE 2/135

Hygrocybe miniata (Fr.) Kumm., Mennigroter Saftling

= *H. strangulata* (Ort.) Svrc.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/92; C 2797 (var. *mollis*); CE 2/133

Hygrocybe mollis ss. Mos. s. *H. helobia*

Hygrocybe murinacea s. *H. nitrata*

Hygrocybe nigrescens s. *H. conica*

Hygrocybe nitrata (Pers.: Fr.) Wünsche, Nichtrotender Nitratsaftling

= *H. murinacea* (Bull.: Fr.) Mos. ss. auct.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/94; RH 251

Hygrocybe obrussea (Fr.: Fr.) Wünsche [non ss. Kühn.], Schnürsporiger Saftling

= *H. quieta* (Kühn.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/95; CE 2/127

Hygrocybe obrussea ss. Kühn. s. *H. cystidiata*

Hygrocybe olivaceonigra s. *H. conica* var. *chloroides*

Hygrocybe persistens (Britz.) Sing., Spitzgebuckelter Saftling

= *H. acutoconica* (Clements) Sing.; = *H. crocea* Bres.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 29.06.87, Heiligenstein bei Gerolstein, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/97; CE 2/93 und 123

Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.) Wünsche, Papageien-Saftling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/98; CE 2/95; RH 252

Hygrocybe punicea (Fr.) Kumm. var. *punicea*, Granatroter Saftling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 - Abb.: BK 3/99; CE 2/117; RH 255

Hygrocybe quieta s. *H. obrussea*

Hygrocybe reai (Mre.) J. Lge., Bitterer Saftling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/100; CE 2/101

Hygrocybe reai var. *insipida* s. *H. insipida*

Hygrocybe riparia s. *H. conica*

Hygrocybe strangulata s. *H. miniata*

Hygrocybe streptopus s. *H. fornicata*

Hygrocybe subglobispora (Ort.) Mos.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 29.06.87, Heiligenstein bei Gerolstein, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2444

Hygrocybe tristis s. *H. conica* var. *chloroides*

Hygrocybe turunda s. *H. coccineocrenata*

Hygrophoropsis s. unter Röhrlingen und verwandten Pilzen

***Hygrophorus* Fr. (Tricholomataceae)**

= *Limacium* (Fr.) Kumm.

s. auch *Camarophyllus*, *Hygrocybe* und *Hygrotrama*

Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. var. *agathosmus*, Wohlriechender Schneckling

Beleg: Gerolstein 5706, L 1971 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/105; CE 2/61; RH 246

Hygrophorus agathosmus var. *hyacinthinus* (Quél.), Hyazinthen-Schneckling

= *H. hyacinthinus* Quél.

Nachw.: EBERT, 1987 (fraglich; bisher nur in Bergnadelwäldern nachgewiesen) - Abb.: BK 3/114; CE 2/63

Hygrophorus aureus s. *H. hypothejus* var. *aureus*

Hygrophorus barbatulus s. *H. penarius*

Hygrophorus camarophyllus (Alb. et Schw.: Fr.) Fr., Rußbrauner Schneckling

= *H. caprinus* Scop.: Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/106; CE 2/71; RH 247

Hygrophorus caprinus s. *H. camarophyllus*

Hygrophorus carpini s. *H. lindtneri*

Hygrophorus chrysaspis s. *H. discoxanthus*

Hygrophorus chrysodon (Batsch: Fr.) Fr., Goldzahn-Schneckling

Beleg: leg. et det. B. Oertel 20.09.87, Gees - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/108; RH 239

Hygrophorus cossus s. *H. discoxanthus*

Hygrophorus dichrous s. *H. personii*

Hygrophorus discoideus (Pers.: Fr.) Fr., Braunscheibiger Schneckling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/109; CE 2/49; RH 244

Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea, Verfärbender Schneckling

= *H. chryaspis* Métz.; = *H. cossus* (Sow.) Fr.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/110; CE 2/25; RH 240

Hygrophorus eburneus (Bull.: Fr.) Fr., Elfenbeinschneckling

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1971 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/111; C 1958 und 2434 (als *H. quercetorum*); RH 241

Hygrophorus fagi s. *H. penarius* var. *fagi*

Hygrophorus flavodiscus s. *H. ligatus*

Hygrophorus gliocyclus s. *H. ligatus*

Hygrophorus hyacinthinus s. *H. agathosmus* var. *hyacinthinus*

Hygrophorus hypothejus (Fr.: Fr.) Fr. var. *hypothejus*, Frost-Schneckling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/115; CE 2/51; RH 245

Hygrophorus hypothejus var. *aureus* (Arrh. in Fr.) Imler

= *H. aureus* Arrh. in Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/49

Hygrophorus latitabundus Britz.

Beleg: Gerolstein 5705, JF 1980 - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81 - Abb.: BK 3/116; CE 2/59 (als *H. limacinus*)

Hygrophorus leucophaeus s. *H. unicolor*

Hygrophorus ligatus Fr., Schleimigberingter Schneckling

= *H. gliocyclus* Fr.; = *H. flavodiscus* Frost in Peck

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/117; CE 2/27 und 29; RH 242

Hygrophorus lindtneri Mos.

= *H. carpini* Grög.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2437; RH 244

Hygrophorus lucorum Kalchbr., Lärchenschneckling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/118; CE 2/53

Hygrophorus mesotephrus Berk. et Br., Olivgrauer Schneckling

Beleg: Berlingen 5706, JF 1980 - Nachw.: KR 1B

Hygrophorus nemoreus (Lasch) Fr., Waldschneckling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/121; CE 2/47

Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.: Fr.) Fr., Natternstieliger Schneckling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/122; RH 246

Hygrophorus penarius Fr. var. *penarius*, Trockener Schneckling

= *H. barbatulus* Becker

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/123; C 1956

Hygrophorus penarius Fr. var. *fagi* (Becker et Bon)

Nachw.: KR 1B

Hygrophorus personii Arn., Olivgestiefelter Schneckling

= *H. dichrous* Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/57; RH 245

Hygrophorus piceae Kühn., Fichten-Schneckling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/124; CE 2/23; RH 240

Hygrophorus poetarum Heim, Isabellrötlicher Schneckling

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1980; Gindorf 5905, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/125

Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr., Weißtannen-Schneckling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/126; CE 2/43

Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr., Schwarzpunktierter Schneckling

=? *H. tephroleucus* (Pers.: Fr.) Fr.

Beleg: Büdesheim 5705, L 1971; Oos 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/127; RH 247

Hygrophorus russula (Schaeff.: Fr.) Quél., Geflecktblättriger Purpurschneckling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/129; CE 2/37; RH 243

Hygrophorus tephroleucus s. *H. pustulatus*

Hygrophorus unicolor Grög., Orangefalber Schneckling

= *H. leucophaeus* (Scop.: Fr.) Fr.

Beleg: Gindorf 5905, L 1980 (als *H. leucophaeus*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/131; CE 2/45

***Hygrotrama* Sing. (Tricholomataceae)**

(z.T. mit *Hygrophorus* in eine Gattung gestellt)

keine Nachweise aus der Eifel

***Hypholoma* (Fr.) Kumm. (Strophariaceae)**

= *Geophila* Quél. pp.

Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) Kumm., Rauchblättriger Schwefelkopf

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/269; RH 446

Hypholoma dispersum s. *H. marginatum*

Hypholoma elongatipes s. *H. elongatum*

Hypholoma elongatum (Pers. emend. Fr.) Rick., Torfmoos-Schwefelkopf

= *H. elongatipes* (Peck) A. H. Smith

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/275; RH 449

Hypholoma epixanthum s. *H. radicosum*

Hypholoma ericaeoides Ort., Geriefter Schwefelkopf

Beleg: leg. H. G. Fuchs, B. Oertel und R. Wingender 15.10.94, Sistig, det. B. Oertel, PE...., **Erstnachweis für die Eifel**

Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm. agg., Grünblättriger Schwefelkopf

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; JAAP, 1910; KR 1B

H. fasciculare var. *fasciculare*

Abb.: RH 447; C 1749 (sterile Form)

H. fasciculare var. *pusillum* J. Lge.

Abb.: C 1752

H. fasciculare var. *subviride* (Berk. et Curt.) Krglst.

Hypholoma marginatum (Pers.: Fr.) Schröt., Geselliger Schwefelkopf

= *H. dispersum* (Fr.) Quél.

(vgl. *H. polytrichi*)

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/271; RH 448

Hypholoma myosotis s. *Pholiota m.*

Hypholoma polytrichi (Fr.) Rick., Moos-Schwefelkopf

(vgl. *H. marginatum*)

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: RH 449

Hypholoma radicosum J. Lge., Wurzelnder Schwefelkopf

= *H. epixanthum* (Fr.) Quél.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 31.08.86, Ormont, PE.... - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *H. elaeodes?*); KR 1B - Abb.: CE 3/273; RH 448

Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2635

Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél., Ziegelroter Schwefelkopf

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: RH 447

Hypholoma udum (Pers.: Fr.) Kühn.

Beleg: leg. Teilnehmer der Hochmoor-Pilztagung (Vulkaneifel) 27.07.86, det. B. Oertel, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/275

***Hypsizygus* Sing. (Tricholomataceae)**

Hypsizygus ulmarius (Bull.: Fr.) Redh., Ulmen-Rasling

= *Lyophyllum ulmarium* (Bull.: Fr.) Kühn.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Pleurotus u.*) - Abb.: BK 3/272; RH 298

***Inocybe* (Fr.) Fr. (Cortinariaceae)**

Inocybe abietis s. *I. glabrescens*

Inocybe abjecta s. *I. flocculosa*

Inocybe acuta Boud.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/379

Inocybe adaequata (Britz.) Sacc., Weinroter Rißpilz

= *I. jurana* (Pat.) Sacc.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 20.09.87, Gees, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/337; RH 471

Inocybe agardhii s. *I. dulcamara* var. *agardhii*

Inocybe albovelutipes Stgl.

=? *I. subnudipes* Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2694; CE 3/375 (*I. subnudipes*)

Inocybe amblyspora Kühn., Blaßknolliger Rißpilz

Nachw.: KR 1B

Inocybe angulatosquamulosa s. *I. ochroalba*

Inocybe appendiculata Kühn.

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B

Inocybe assimilata (Britz.) Sacc., Rundknolliger Rißpilz

= *I. umbrina* Bres.

Beleg: Gees 5706, L 1980 (als *I. umbrina*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/381

Inocybe asterospora Quél., Sternsporiger Rißpilz

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1849

Inocybe auricoma (Batsch) J. Lge.

Nachw.: KR 1B

Inocybe boltonii s. *I. subcarpta*

Inocybe bongardii (Weinm.) Quél. var. *bongardii*, Duftender Rißpilz

Beleg: Gerolstein 5705, JF 1980; Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/349; RH 473

Inocybe bongardii var. *cervicolor* (Pers.) Henkel, Hirschbrauner Rißpilz

= *I. cervicolor* (Pers.) Quél.

Belege: leg. et det. B. Oertel 29.06.87, Heiligenstein bei Gerolstein, PE....; Gerolstein 5705, L 1980; Müllenborn 5705, L 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *I. hirsuta*); KR 1B - Abb.: CE 3/347

Inocybe bresadolae Mass., Rötlichfuchsiger Rißpilz

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1848

Inocybe brevispora s. *I. soluta*

Inocybe brunnea s. *I. splendens* var. *phaeoleuca*

Inocybe brunneoatra s. *I. fuscidula*

Inocybe casimiri s. *I. lanuginosa* var. *casimiri*

Inocybe cervicolor s. *I. bongardii* var. *cervicolor*

Inocybe cincinnata (Fr.: Fr.) Quél. var. *cincinnata*, Lilaspitziger Rißpilz
= *I. cincinnatula* Kühn.; = *I. obscuroides* Ort.; = *I. phaeocomis* (Pers.) Kuyper
Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/375; RH 477

Inocybe cincinnata var. *major* (Peters.) Kuyper
= *I. obscura* (Pers.: Fr.) Gill.

Beleg: Gerolstein 5706, JF 1980; Gerolstein 5705, L 1980; Gerolstein 5705, PJ 1980 (alle als *I. obscura*) -
Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/373

Inocybe commutabilis s. *I. sindonia*

Inocybe concinnula Fav.

Nachw.: KR 1B

Inocybe confusa s. *I. rimosa* var. *rimosa*

Inocybe cookei Bres., Knolliger Rißpilz

Beleg: Gindorf 5905, Biol. Stat. Weijster; Reisrod 5706, JF 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/339 (die Stielknolle ist nicht zu sehen!); RH 471

Inocybe corydalina Quél. var. *corydalina*, Grünbuckeliger Rißpilz

Belege: leg. et det. B. Oertel 20.09.87, Gees, PE....; Reisrod 5706, L 1980; Gerolstein 5705, PJ 1980;
Berlingen 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/357

Inocybe corydalina var. *tricolor* (Kühn.) Krglst.

= *I. tricolor* Kühn.

Beleg: Berlingen 5706, Tj 1980 (als *I. tricolor*) - Nachw.: KR 1B

Inocybe curvipes Karst.

= *I. decipientoides* Peck; = *I. lanuginella* (Schröt.) Konr. et Maubl.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2708

Inocybe decipiens Bres.

Beleg: Reisrod 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B

Inocybe decipientoides s. *I. curvipes*

Inocybe dulcamara (Alb. et Schw.: Pers.) Kumm. var. *dulcamara*

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/335 (als var. *axantha*)

Inocybe dulcamara var. *agardhii* (Lund.) Krglst., Olivgelber Rißpilz

= *I. agardhii* (Lund) Ort.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/333; RH 470

Inocybe erubescens Blytt, Ziegelroter Rißpilz

= *I. patouillardi* Bres.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/335; RH 470

Inocybe eutheles s. *I. sindonia*

Inocybe fastigiata s. *I. rimosa* var. *rimosa*

Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc. var. *flocculosa*

= *I. abjecta* (Karst.) Sacc.; = *I. gausapata* Kühn.; = *I. lucifuga* (Fr.) Quél.; = *I. subtigrina* Kühn.

Beleg: Gerolstein 5705, JF 1980; Gerolstein 5705, L 1980 (beide als *I. gausapata*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1839, 1841 und 2312; CE 3/371

Inocybe fraudans (Britz.) Sacc., Birnen-Rißpilz

= *I. pyriodora* (Pers.: Fr.) Kumm.

Beleg: Gindorf, 5905, L 1980 (als *I. pyriodora*) - Nachw.: KR 1B

Inocybe friesii s. *I. nitidiuscula*

Inocybe fuscidula Vel.

= *I. brunneoatra* (Heim) Ort.; = *I. hypophaea* Furrer; = *I. virgatula* Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2311; CE 3/369 und 371

Inocybe fuscomarginata Kühn.

= *I. relicina* ??Autor ss. Heim

Nachw.: EBERT, 1987 (als *I. relicina* ?); KR 1B

Inocybe gausapata s. *I. flocculosa*

Inocybe geophylla (Sow.: Fr.) Kumm., Erdblättriger Rißpilz

= *I. geophylla* var. *lilacina* Fr.; = *I. geophylla* var. *violacea* Pat.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/351 oben und unten; RH 474 oben und unten

Inocybe geophylla var. *lateritia* s. *I. whitei*

Inocybe geraniodora Fav.

Nachw.: KR 1B

Inocybe glabrescens Vel.

= *I. abietis* Kühn.; = *I. metrodii* Stgl. et Vesel.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/359

Inocybe godeyi Gill., Rötender Rißpilz

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1831

Inocybe griseolilacina J. Lge., Grauvioletter Rißpilz

= *I. personata* Kühn.

Beleg: Gerolstein 5705, L 1980; Müllenborn 5705, L 1980 (beide als *I. personata*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2697; CE 3/373; RH 476

Inocybe gymnocarpa Kühn., Rotschuppiger Rißpilz

Nachw.: KR 1B

Inocybe haemacta (Berk. et Cke.) Sacc.

Nachw.: KR 1B

Inocybe hirtella Bres., Bittermandel-Rißpilz

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1980; Gindorf 5905, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/363; RH 475

Inocybe hygrophorus Kühn.

Nachw.: KR 1B

Inocybe hypophaea s. *I. fuscidula*

Inocybe hystrix (Fr.) Karst., Sparriger Rißpilz

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1980; Gees 5706, RIN 1980 - Nachw.: KR 1B

Inocybe jurana s. *I. adaequata*

Inocybe kuehneri s. *I. sindonia*

Inocybe lacera (Fr.: Fr.) Kumm., Struppiger Rißpilz

[incl. var. *helobia* Kuyper] ??

=? *I. maritima* Fr.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 30.06.87, Satzvey - Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 477

Inocybe lanuginella s. *I. curvipes*

Inocybe lanuginosa (Bull.: Fr.) Kumm. var. *lanuginosa*

= *I. longicystis* Atk.

Belege: leg. et det. B. Oertel 26.07.86, Moß bei Gerolstein, PE....; leg. et det. B. Oertel 09.08.86, Blankenheim-Nonnenbach, PE....; Oos 5705, L 1980; Gerolstein 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/383

Inocybe lanuginosa var. *casimiri* (Vel.)

= *I. casimiri* Vel.

Nachw.: KR 1B

Inocybe lanuginosa var. *ovatocystis* (Bours. et Kühn.) Stgl. et Brsky.

= *I. ovatocystis* Kühn.

Nachw.: KR 1B

Inocybe leiocephala Stuntz

= *I. subbrunnea* Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/363

Inocybe leptocystis ss. Kühn. s. *I. obscuroidia*

Inocybe longicystis s. *I. lanuginosa* var. *lanuginosa*

Inocybe lucifuga s. *I. flocculosa*

Inocybe lucifuga f. *gralla* s. *I. sindonia*

Inocybe maculata Boud., Gefleckter Rißpilz

Belege: leg. F. Kaiser 02.10.87, det. T. Kuyper, Berndorf, PE....; Gerolstein 5705, Biol. Stat. Weijster 1980; Gerolstein 5705, PJ 1980; Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980 - Nachw.: EBERT, 1987 (die var. *fastigiella*); KR 1B

Inocybe maritima s. *I. lacera*

Inocybe melanopus Stuntz, Braungestiefelter Rißpilz

= *I. submaculipes* Fav.

Nachw.: KR 1B

Inocybe metrodii s. *I. glabrescens*

Inocybe mixtilis (Britz.) Sacc., Gerandetknolliger Rißpilz

Beleg: Reisrod 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1853; CE 3/391

Inocybe muricellata Bres., Gelbbrauner Schüppchen-Rißpilz

= *I. scabella* Fr. ss. Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2701 und 2702

Inocybe napipes J. Lge., Rübenstieliger Rißpilz

Belege: leg. et det. B. Oertel 26.07.86, Moß bei Gerolstein, PE....; Moß b. Gerolstein 5706, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B

Inocybe nitidiuscula (Britz.) Sacc.

= *I. friesii* R. Heim; = *I. tarda* Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/365; RH 476

Inocybe oblectabilis (Britz.) Sacc. ss. str.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2711; CE 3/389

Inocybe obscura s. *I. cincinnata* var. *major*

Inocybe obscuroides (Fav.) Grund et Stuntz

= *I. leptocystis* Atk. ss. Kühn. [non ss. Mos.]; = *I. tenuicystidiata* Horak et Stgl.

Beleg: Gees 5706, JF 1980 (als *I. leptocystis*) - Nachw.: KR 1B

Inocybe obscuroides s. *I. cincinnata* var. *cincinnata*

Inocybe obscuroides s. *I. rimosa* var. *obsoleta*

Inocybe ochroalba Bruylants

= *I. angulosquamulosa* Stgl.; = *I. subalbidodisca* Stgl. et Vesel.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1834 und 1854

Inocybe ovaticystis s. *I. lanuginosa* var. *ovaticystis*

Inocybe paludinella Peck, Schmieriger Reißpilz

Nachw.: KR 1B

Inocybe patouillardii s. *I. erubescens*

Inocybe pelargonium Kühn., Pelargonien-Reißpilz

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/361

Inocybe perlata s. *I. rimosa* var. *perlata*

Inocybe personata s. *I. griseolilacina*

Inocybe petiginosa (Fr.: Fr.) Gill., Graugezonter Reißpilz

Beleg: Müllenborn 5705, Biol. Stat. Wijster; Berlingen 5706, L 1980; Gerolstein 5706, L 1980; Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/383

Inocybe phaeocomis s. *I. cincinnata* var. *cincinnata*

Inocybe phaeodisca Kühn.

Nachw.: EBERT, 1987 (die var. *geophylloides*); KR 1B - Abb.: C 2704 (var. *geophylloides*)

Inocybe phaeoleuca s. *I. splendens* var. *phaeoleuca*

Inocybe posterula (Britz.) Sacc., Falber Reißpilz

= *I. xanthodisca* Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C (?)1840 und 1845

Inocybe praetervisa Quél.

Beleg: Müllenborn 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B

Inocybe pseudasterospora Kühn. et Bours.

Nachw.: KR 1B

Inocybe pudica s. *I. whitei*

Inocybe pusio Karst.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2705

Inocybe pyriodora s. *I. fraudans*

Inocybe quietiodor Bon, Unangenehmriechender Reißpilz

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1823

Inocybe relicina ss. Heim s. *I. fuscomarginata*

Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) Kumm. var. *rimosa*, Kegeliger Reißpilz

= *I. confusa* Karst.; = *I. fastigiata* (Schaeff.) Quél.

Belege: leg. et det. B. Oertel 29.06.87, Heiligenstein bei Gerolstein, PE....; Müllenborn 5705, L 1980; Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980 (beide als *I. fastigiata*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/343; RH 473

Inocybe rimosa var. *obsoleta* (Romagn.) Kuyper

= *I. obsoleta* Romagn.

Beleg: Oos 5705, CH 1980; Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980 (beide als *I. obsoleta*) - Nachw.: KR 1B

Inocybe rimosa var. *perlata* (Cke.) Kuyper

= *I. perlata* (Cke.) Sacc.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/341

Inocybe scabella s. *I. muricellata*

Inocybe sindonia (Fr.) Karst.

= *I. commutabilis* Furrer; = *I. eutheles* (Berk. et Br.) Quél. ss. Kühn.; = *I. kuehneri* Stgl. et Ves.; = *I. lucifuga* (Fr.) Quél. f. *gralla* Furrer

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1836 und 1846

Inocybe soluta Vel.

= *I. brevispora* Huijism.

Nachw.: KR 1B

Inocybe splendens Heim var. *phaeoleuca* (Kühn.) Kuyper

= *I. brunnea* Quél.; = *I. phaeoleuca* Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1835

Inocybe squamata Rea, Dunkelschuppiger Rißpilz

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1825; RH 472

Inocybe squarrosa Rea

Nachw.: KR 1B

Inocybe subalbidodisca s. *I. ochroalba*

Inocybe subbrunnea s. *I. leiocephala*

Inocybe subcarpta Kühn. et Bours.

= *I. boltonii* Heim

Nachw.: KR 1B

Inocybe submaculipes s. *I. melanopus*

Inocybe subnudipes s. *I. albovelutipes*

Inocybe subporospora Kuyper

Nachw.: KR 1B

Inocybe subtigrina s. *I. flocculosa*

Inocybe tarda s. *I. nitidiuscula*

Inocybe tenuicystidiata s. *I. obscurobadia*

Inocybe terrigena (Fr.) Kuyper, Schuppenstieliger Rißpilz

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Pholiota t.*); KR 1B - Abb.: CE 3/331; RH 469

Inocybe tigrina Heim

Nachw.: KR 1B

Inocybe tricolor s. *I. corydalina* var. *tricolor*

Inocybe umbratica Quél., Weißlicher Rißpilz

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 - Abb.: CE 3/389

Inocybe umbrina s. *I. assimilata*

Inocybe virgatula s. *I. fuscidula*

Inocybe whitei (Berk. et Br.) Sacc., Weißrosa Rißpilz

= *I. geophylla* (Sow.: Fr.) Kumm. var. *lateritia* Weinm.; = *I. pudica* Kühn.

Beleg: Gerolstein 5706, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/353 oben und unten; RH 475

Inocybe xanthodisca s. *I. posterula*

Inocybe xanthomelas Bours. et Kühn., Dunkelstieliger Rißpilz

= *I. xanthomelaena*

Nachw.: KR 1B

***Kuehneromyces* Sing. et A. H. Smith (Strophariaceae)**

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.: Fr.) Sing. et A. H. Smith, Stockschwämmchen

= *Dryophila m.* (Schaeff.: Fr.)

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Pholiota m.*); FUCHS, 1993; JAAP, 1910 (als *Pholiota m.*); KR 1B - Abb.: RH 462

***Laccaria* Berk. et Br. (Tricholomataceae)**

Laccaria amethystea (Bull.) Murr., Violetter Lacktrichterling

= *L. amethystina* Cke.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/228; CE 2/149

Laccaria bicolor (Mre.) Ort., Zweifarbiger Lacktrichterling

= *L. proxima* (Boud.) Pat. var. *bicolor* Mre.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1908; RH 266

Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. et Br., Rötlicher Lacktrichterling

= *L. ohiensis* (Mont.) Sing.; = *L. tetraspora* Sing.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/231; RH 266

Laccaria ohiensis s. *L. laccata*

Laccaria proxima (Boud.) Pat.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 2/151; RH 267

Laccaria proxima var. *bicolor* s. *L. bicolor*

Laccaria purpureobadia Reid

Nachw.: KR 1B

Laccaria tetraspora s. *L. laccata*

Laccaria tortilis (Bolt.) Cke., Stachelsporiger Lacktrichterling

Beleg: Gerolstein 5706, RS 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/233; C 2392

Lacrymaria Pat. (Coprinaceae)

Lacrymaria lacrymabunda (Bull.: Fr.) Pat., Tränender Saumpilz

= *Drosophila velutina* (Pers.) Kühn. et Romagn.; = *Psathyrella velutina* (Pers.) Sing.; =? *Psathyrella pyrotricha* (Holmsk.) Mos.

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 (als *Psathyrella velutina*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Hypholoma lacrimabundum*); FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/211; RH 434

Lactarius s. bei den Sprödblättlern

***Lentinellus* Karst. (Lentinellaceae)**

Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) Karst. agg.

Nachw.: KR 1A

L. cochleatus var. *cochleatus*, Anis-Zähling

Nachw.: EBERT, 1987; FUCHS, 1993 - Abb.: BK 3/234; CE 1/395; RH 110

L. cochleatus var. *inolens* Konr. et Maubl.

Nachw.: EBERT, 1987

Lentinellus flabelliformis (Bolt.: Fr.) Ito

Beleg: Gerolstein 5706, L 1971 - Nachw.: KR 1A

Lentinellus omphalodes (Fr.) Karst., Genabelter Zähling

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 3/235; CE 1/395; RH 109

***Lentinus* Fr. (Polyporaceae)**

Lentinus adhaerens (Alb. et Schw.: Fr.) Fr., Harziger Sägeblättling

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 3/237; C 2808

Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Fr., Becherförmiger Sägeblättling

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 1/427

Lentinus lepideus (Fr.: Fr.) Fr., Schuppiger Sägeblättling

Beleg: leg. et det. B. Oertel 26.07.86, Gees, PE.... - Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 3/238; RH 208

Lentinus suavissimus Fr., Anis-Knäueling

= *Panus* s. (Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 3/239; C 2451

Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr., Getigertes Knäueling

= *Panus t.* (Bull.: Fr.) Sing.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1A - Abb.: BK 3/240; CE 1/423

***Lepiota* (Pers.) S. F. Gray (Agaricaceae)**

s. auch *Chamaemyces*, *Cystolepiota*, *Leucoagaricus*, *Leucocoprinus*, *Macrolepiota*, *Melanophyllum* und *Sericeomyces*

Lepiota acutesquamosa s. *L. aspera*

Lepiota alba (Bres.) Sacc., Weißer Schirmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/109

Lepiota aspera (Pers.: Fr.) Quél., Spitzschuppiger Schirmling

= *L. acutesquamosa* (Weinm.: Fr.) Gill.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/95

Lepiota brunneoincarnata Chod. et Mart., Fleischbräunlicher Schirmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2161

Lepiota castanea Quél., Kastanienbrauner Schirmling

= *L. ignipes* Locq. ex Bon

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/103

Lepiota clypeolaria (Bull.: Fr.) Kumm., Wolliggestiefler Schirmling

Beleg: Berlingen 5706, L 1980; Berlingen 5706, RIN 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/105

Lepiota cortinarius J. Lge., Schleier-Schirmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/101

Lepiota cretacea ss. Kühn. et Romagn. vgl. *Leucocoprinus cretatus*

Lepiota cristata (Bolt.: Fr.) Kumm., Stink-Schirmling

vgl. noch die var. *felinoides* Bon

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/99; RH 413

Lepiota echinacea J. Lge., Igel-Schirmling

Nachw.: KR 1B

Lepiota felina (Pers.: Fr.) Karst., Schwarzschruppiger Schirmling

Beleg: Oos 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1714

Lepiota fulvella Rea, Fuchsbräunlicher Schirmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 414

Lepiota fuscovinacea Möll. et J. Lge.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/113

Lepiota grangei (Eyre) J. Lge., Grünschruppiger Schirmling

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, CH 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2592

Lepiota griseovirens Mre.

Beleg: Wachtberg-Arzdorf 5308, leg. et det. B. Oertel 1992, PE...., **Erstnachweis für das Gebiet**

0 *Lepiota hystrix* Möll. et J. Lge., Kegelschruppiger Schirmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/97

0 *Lepiota ignipes* s. *L. castanea*

Lepiota ignivolvata Bousset et Joss., Glatte Schirmling

Nachw.: KR 1B

Lepiota irrorata s. *Chamaemyces fracidus*

Lepiota kühneri s. *L. subincarnata*

Lepiota metulaespora s. *L. ventriospora*

Lepiota subalba Kühn. ex Ort.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2158

Lepiota subgracilis Kühn. ex Wass., Körnigschuppiger Schirmpilz

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/109

Lepiota subincarnata Lge.

= *L. kühneri* Huijism.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1713 und 2594

Lepiota ventriosospora Reid, Gelbgestiefelter Schirmling

= *L. metulaespora* (Berk. et Br.) Sacc.

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980; Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/105; RH 415

***Lepista* (Fr.) W. G. Smith (Tricholomataceae)**

= *Rhodopaxillus* Mre.

Lepista flaccida (Sow.: Fr.) Pat. f. *flaccida*, Fuchsiges Röteltrichterling

= *L. inversa* (Scop.: Fr.) Pat.; = *Clitocybe flaccida* (Sow.: Fr.) Kumm.; = *Clitocybe inversa* Scop.: Fr.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/244; CE 2/207

Lepista flaccida f. *gilva* (Pers.: Fr.) Krglst., Wasserfleckiger Röteltrichterling

= *Clitocybe gilva* ??Autor; = *Clitocybe splendens* (Pers.: Fr.) Gill.

Beleg: Moß b. Gerolstein 5706, JF 1980; Oos 5705, PJ 1980 (beide als *L. gilva*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: RH 279

Lepista gilva s. *L. flaccida* f. *gilva*

Lepista glaucocana s. *L. nuda* var. *glaucocana*

Lepista inversa s. *L. flaccida*

Lepista irina (Fr.) Bigel., Veilchen-Ritterling

= *Tricholoma irinum* (Fr.) Kumm.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/245; CE 2/201; RH 278

Lepista luscina s. *L. panaeola*

Lepista nebularis s. *Clitocybe n.*

Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cke. var. *nuda*, Violetter Rötelritterling

=? *L. nuda* var. *tridentina* Sing.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Tricholoma nudum*); FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/247; CE 2/189

Lepista nuda var. *glaucocana* (Bres.) Krglst., Blaßblauer Rötelritterling

= *L. glaucocana* (Bres.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/243

Lepista ovispora s. *Lyophyllum ovisporum*

Lepista panaeola (Fr.) Karst., Horngrauer Rötelritterling

= *L. luscina* (Fr.: Fr.) Sing.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Clitocybe nimbata*) - Abb.: BK 3/246; CE 2/203 und 205 (als *L. rickenii*); RH 278

Lepista personata (Fr.: Fr.) Cke., Lilastieliger Rötelritterling

= *L. saeva* (Fr.) Ort.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Tricholoma personatum*); KR 1B - Abb.: BK 3/248; CE 2/195; RH 277

Lepista ricekii Bon

= *L. piperata* Ricek

Nachw.: FRENCKEN 1971/72 (als *Clitocybe cerrussata* var. *piperata*) - Abb.: BK 3/249

Lepista saeva s. *L. personata*

Lepista sordida (Schum.: Fr.) Sing., Schmutziger Röteltrichterling

Belege: leg. et det. B. Oertel 14.11.92, Dollendorf, PE....; leg. M. Schröder 14.11.94, Ahrweiler, det. B. Oertel, PE.... - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/250; CE 2/187

Lepista splendens s. *L. flaccida* f. *gilva*

Leptoglossum s. *Arrhenia*, *Omphalina* und *Rimbachia*

***Leucoagaricus* Locq.: Sing. (Agaricaceae)**

(z.T. bei *Lepiota* mit untergebracht)

Leucoagaricus cretaceus Bull. ss. Locqu. [nicht *Lepiota cretacea* ss. Kühn. et Romagn.; vgl. *Leucocoprinus cretatus*], Bräunender Egerlings-Schirmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/139; RH 418

Leucoagaricus holosericeus (Fr.) Mos., Seidiger Egerlings-Schirmling

[eventuell identisch mit *L. leucothites*??(Oe)]

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: C 1710

Leucoagaricus leucothites (Vitt.) S. Wass., Rosablättriger Egerlings-Schirmling

= *L. naucinus* (Fr.) Sing.; = *L. pudicus* (Bull.) ??Autor ss. Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2600; CE 3/135 und 137

Leucoagaricus litoralis (Menier) Bon et Boiff.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2602

Leucoagaricus naucinus s. *L. leucothites*

Leucoagaricus pudicus s. *L. leucothites*

***Leucocoprinus* Pat. (Agariaceae)**

(z.T. bei *Lepiota* mit untergebracht)

Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Sing., Gelber Faltenschirmling

= *Lepiota lutea* ??Autor

[nur selten im Freiland wild wachsend]

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/145; RH 419

Leucocoprinus brebissonii (God. in Gill.) Locq.

[nur selten im Freiland wild wachsend]

Nachw.: KR 1B

Leucocoprinus cretatus Locq.

= *Lepiota cretacea* ss. Kühn. et Romagn. pp.

Nachw.: KR 1B; Wachtberg-Arzdorf, auf einem Haufen mit Gartenabfällen, leg. et det. B. Oertel - Abb.: CE 3/145

Leucocoprinus luteus s. *L. birnbaumii*

***Leucocortinarius* J. Lge.: Sing. (Cortinariaceae)**

Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schw.: Fr.) Sing., Knolliger Schleierritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/767; RH 523

***Leucopaxillus* Bours. (Tricholomataceae)**

s. auch *Aspropaxillus*

Leucopaxillus amarus s. *L. gentianeus*

Leucopaxillus gentianeus (Qué.) Kotl., Bitterer Krempe Ritterling

= *L. amarus* (Alb. et Schw.: Fr.) Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/389; RH 309

Leucopaxillus paradoxus (Cost. et Dufour) Bours.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/381

***Limacella* Earle (Amanitaceae)**

Limacella guttata (Fr.) Konr. et Maubl., Getropfter Schleimschirmling

= *L. lenticularis* (Lasch)

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1971; Reisrod b. Gees 5706, L 1980; Oos 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/707; RH 403

Limacella illinita (Fr.) Murr., Glänzender Schleimschirmling

Beleg: leg. et det. B. Oertel, Schönecken, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/709

Limacella lenticularis s. *L. guttata*

Limacella vinosorubescens Furrer

(vgl. *Cystoderma superbum*)

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/713

***Lyophyllum* Karst. (Tricholomataceae)**

incl. *Tephrocybe* Donk; s. auch *Calocybe*

Lyophyllum admissum s. *L. palustre*

Lyophyllum aggregatum s. *L. decastes* var. *decastes*

Lyophyllum aggregatum var. *fumosum* s. *L. decastes* var. *fumosum*

Lyophyllum aggregatum var. *ovisporum* s. *L. ovisporum*

Lyophyllum (*Tephrocybe*) *ambustum* (Fr.: Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/254; C 2769

Lyophyllum (*Tephrocybe*) *anthracophilum* (Lasch)

= *L. sphaerosporum* Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/255; C 1911

Lyophyllum (*Tephrocybe*) *atratum* (Fr.: Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2394

Lyophyllum (*Tephrocybe*) *boudieri* Kühn. et Romagn., Flockenstieliges Graublatt

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2397; RH 302

Lyophyllum caerulescens Clém., Dickblättriger Rasling

= *L. crassifolium* (Berk.) Sing.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 16.10.89, Rinnen, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/323

Lyophyllum connatum (Schum.: Fr.) Sing., Weißer Rasling

= *Clitocybe connata* Schum.: Fr.

Beleg: Berlingen 5706, HA 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/256; CE 2/335; RH 300

Lyophyllum crassifolium s. *L. caerulescens*

Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Sing. var. *decastes*, Büschelrasling

= *L. aggregatum* (Schaeff. ex Secr.) Kühn.; =? *L. loricatum* (Fr.) Kühn.

Beleg: Gees 5706, JF 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/257 und (?) 262; CE 2/335 und 337; RH 300

Lyophyllum decastes var. *fumosum* (Pers.: Fr.) Kühn., Frost-Rasling

= *L. aggregatum* (Schaeff. ex Secr.) Kühn. var. *fumosum*; = *L. fumosum* (Pers.: Fr.) Ort.

Beleg: Berlingen 5706, RIN 1980 (als *L. fumosum*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Tricholoma conglobatum*); KR 1B - Abb.: BK 3/260; CE 2/339

Lyophyllum deliberatum (Britz.) Kreis., Rautensporiger Schwärzling

= *L. infumatum* (Bres.) Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/329; RH 299

Lyophyllum fumosum s. *L. decastes* var. *fumosum*

Lyophyllum immundum s. *L. paelochroum*

Lyophyllum incarnatobrunneum Gerhardt, Fleischbräunlicher Rasling

= *Tricholoma boreale* (Fr.) Karst.; = *Tricholoma civile* (Fr.) Gill.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/283

Lyophyllum infumatum s. *L. deliberatum*

Lyophyllum (Tephrocycbe) inolens Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/349

Lyophyllum loricatum s. *L. decastes*

Lyophyllum ovisporum (J. Lge.) Reid

= *L. aggregatum* (Schaeff. ex Secr.) Kühn. var. *ovisporum* (J. Lge.); = *Lepista ovispora* (J. Lge.) Gulden

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2777

Lyophyllum paelochroum Clém., Lehmfarbener Rasling

= *L. immundum* (Berk.) Kühn.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 17.10.89, Rinnen, Beleg Nr. 2 / kleiner Frk., PE....; leg. et det. B. Oertel 01.11.89, Eschweiler, PE.... - Nachw.: KR 1B

Lyophyllum (Tephrocye) palustre (Peck) Donk, Sumpf-Graublatt

=? *Tephrocye admissa* (Britz.) Mos.; =? *Clitocybe admissa* (Britz.) Kühn. et Romagn.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 26.07.86, Moß bei Gerolstein, PE..... - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/265; C 1910; CE 2/349 (*Tephrocye admissa*); RH 301

Lyophyllum plexipes s. *L. tylicolor*

Lyophyllum (Tephrocye) rancidum (Fr.), Wurzel-Graublatt

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/267; CE 2/347; RH 301

Lyophyllum sphaerosporum s. *L. anthracophilum*

Lyophyllum tesquorum s. *L. tylicolor*

Lyophyllum (Tephrocye) tylicolor Fr.: Fr.

= *Tephrocye tesquorum* (Fr.) Mos.; = *L. plexipes* Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/269 und 271

Lyophyllum ulmarium s. *Hypsizygus ulmarius*

***Macrocystidia* Joss. (Tricholomataceae)**

Macrocystidia cucumis (Pers.: Fr.) Joss., Gurkenschnitzling

[incl. var. *latifolia* (J. Lge.) Arn. und var. *leucospora* J. Lge.]

Beleg: Reisrod b. Gees, Biol. Stat. Weijster; Gerolstein 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/273; CE 2/477 und 479; RH 342

***Macrolepiota* Sing. (Agariaceae)**

(z.T. bei *Lepiota* mit untergebracht)

Macrolepiota excoriata (Schaeff.: Fr.) S. Wass., Acker-Schirmling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/125; RH 418

Macrolepiota gracilentata s. *M. mastoidea*

Macrolepiota konradii (Huijsm.: Ort.) Mos., Sternschuppiger Riesenschirmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2597

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Sing., Zitzen-Schirmling

= *M. gracilentata* (Krombh.) S. Wass.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/129 und 131; RH 417

Macrolepiota permixta (Barla) Pacioni

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/117

Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing., Parasol

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/115; RH 416

Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos., Jungfern-Schirmling

= *Lepiota rhacodes* (Vitt.) Sing. var. *puellaris* Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/123

Macrolepiota rachodes (Vitt.) Sing. var. *rachodes*, Safranschirmling

= *M. rhacodes*

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/121; RH 417

Macrolepiota rachodes var. *hortensis* Pil., Garten-Riesenschirmling

= *M. rachodes* var. *bohemica* (Wich.) Bellù et Lanzoni; =? *M. venenata* Jacob ex Bon

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1706 und (?)1707

Macrolepiota rhacodes var. *puellaris* s. *M. puellaris*

Macrolepiota venenata vgl. *M. rachodes* var. *hortensis*

***Marasmiellus* Murr. (Tricholomataceae)**

(z.T. mit zu *Marasmius* gestellt)

Marasmiellus albuscorticis s. *M. candidus*

Marasmiellus amadelphus s. *M. ramealis*

Marasmiellus candidus (Bolt.: Fr.) Sing.

= *M. albuscorticis* (Secr.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1880

Marasmiellus languidus s. *M. vaillantii*

Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Sing., Ast-Schwindling

=? *M. amadelphus* (Bull.: Fr.) Mos.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/274; CE 2/435; RH 324

Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.) Sing., Matter Zwergschwindling

= *M. languidus* (Lasch) Sing. ss. Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/275

***Marasmius* Fr. (Tricholomataceae)**

s. auch *Collybia*, *Marasmiellus* und *Micromphale*

Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr., Langstieliger Knoblauchschwindling

Beleg: Müllenborn 5705, Biol. Stat. Weijster 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; JAAP, 1910; KR 1B - Abb.: BK 3/276; CE 2/471; RH 330

2 *Marasmius androsaceus* (L.: Fr.) Fr., Roßhaar-Schwindling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/277; CE 2/469; RH 328

2 *Marasmius bulliardii* s. *M. wettsteinii*

Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Fr., Hornstieliger Schwindling

Beleg: Müllenborn 5705, Biol. Stat. Weijster 1980; Oos 5705, L 1980; Berlingen 5706, Tj 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/282; CE 2/475; RH 332

Marasmius collinus s. *M. oreades*

Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr., Aderblättriger Schwindling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/285; CE 2/467; RH 329

Marasmius globularis s. *M. wynnei*

Marasmius graminum (Liberta) Berk., Orangerötlicher Schwindling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/286; CE 2/465

Marasmius lupuletorum s. *M. torquescens*

Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr., Nelkenschwindling

=? *M. collinus* (Scop.: Fr.) Sing.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; JAAP, 1910 (als *M. caryophylleus*); KR 1B - Abb.: BK 3/289; CE 2/473; RH 331

Marasmius quercophilus Pouz., Gedrängtblättriger Schwindling

= *M. splachnoides* (Hornem.: Fr.) Fr. ss. Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2742; RH 328

Marasmius recubans s. *M. setosus*

Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr., Halsband-Schwindling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/291; CE 2/465; RH 327

Marasmius scorodonius (Fr. Fr.) Fr., Küchen-Schwindling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/292; RH 329

Marasmius setosus (Sow.) Noord., Niederliegender Schwindling

= *M. recubans* Quél.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/290

Marasmius splachnoides s. *M. quercophilus*

Marasmius torquescens Quél., Ledergelber Schwindling

= *M. lupuletorum* (Weinm.) Bres. [non ss. Bres.]

Beleg: Müllenborn 5705, Biol. Stat. Weijster 1980; Berlingen 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/294; CE 2/477; RH 333

Marasmius wettsteinii Sacc. et Syd., Käsepilzchen

= *M. bulliardii* Quél.

Beleg: Müllenborn 5705, Biol. Stat. Weijster 1980 (als *M. bulliardii*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/278; RH 327

Marasmius wynnei Berk. et Br., Violettlicher Schwindling

= *M. globularis* Fr. in Quél.

Beleg: Gerolstein 5705, RIN 1980; Berlingen 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/295; CE 2/475; RH 332

***Megacollybia* Kotl. et Pouz. (Tricholomataceae)**

Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. et Pouz., Breitblättriger Rübling

= *Collybia p.* Pers.: Fr.; = *Oudemansiella platyphylla* (Pers.: Fr.) Mos.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/296

***Melanoleuca* Pat. (Tricholomataceae)**

Melanoleuca adstringens (Pers.: Fr.) Konr., Starkkriechender Weichritterling

Nachw.: KR 1B

Melanoleuca arcuata (Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/401

Melanoleuca brevipes (Bull.: Fr.) Pat., Kurzstieliger Weichritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/297; RH 313

Melanoleuca cognata (Fr.) Konr. et Maubl., Frühlings-Weichritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/298; CE 2/407

Melanoleuca graminicola (Vel.) Kühn. et Mre.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/301; CE 2/393

Melanoleuca grammopodia (Bull.: Fr.) Pat., Rillstieliger Weichritterling

= *M. subbrevipes* Métr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/399 und 409; RH 313

Melanoleuca humilis (Pers.: Fr.) Pat., Niedriger Weichritterling

Beleg: Müllenborn 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/302; CE 2/393

Melanoleuca melaleuca (Pers.: Fr.) Murr., Gemeiner Weichritterling

Beleg: Gerolstein 5705, JF 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Tricholoma melaleucum*); KR 1B - Abb.: CE 2/403; RH 314

Melanoleuca microcephala (Karst.) Métr., Filzhütiger Weichritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2775

Melanoleuca schumacheri (Fr.) Sing.

Beleg: Gerolstein 5706, JF 1980 - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81

Melanoleuca subbrevipes s. *M. grammopodia*

***Melanophyllum* Vel. (Tricholomataceae ?)**

(z.T. bei *Lepiota* mit untergebracht)

Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.) Kreis., Blutblättriger Zwergschirmling

= *M. echinatum* (Roth: Fr.) Sing.

Beleg: Oos 5705, JG 1980 (als *M. echinatum*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/87; RH 410

***Melanotus* Pat. (Strophariaceae)**

Melanotus phillipsii (Berk. et Br.) Sing.

= *Crepidotus p.* (Berk. et Br.) Sacc.; = *Geophila p.* (Berk. et Br.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2632

***Microcollybia* Lennox (Tricholomataceae)**

(z.T. zu *Collybia* gestellt)

Microcollybia cirrhata (Pers.: Fr.) Lennox, Seidiger Zwerggrübling

Nachw.: JAAP, 1910; KR 1B - Abb.: BK 3/201; CE 2/415

Microcollybia cookei (Bres.) Lennox, Gelbkolliger Zwergrübling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/202; RH 318

Microcollybia tuberosa (Bull.: Fr.) Lennox, Braunkolliger Zwergrübling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/203; CE 2/419; RH 317

***Micromphale* Nees: S. F. Gray (Tricholomataceae)**

(z.T. mit zu *Marasmius* gestellt)

Micromphale acicola s. *M. brassicolens*

Micromphale brassicolens (Romagn.) Ort.

= *M. acicola* Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/308; CE 2/439

Micromphale foetidum (Sow.: Fr.) Sing., Stink-Schwindling

Beleg: Müllenborn 5705, Biol. Stat. Weijster 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/309; CE 2/437; RH 326

Micromphale perforans (Hoffm.: Fr.) S. F. Gray, Nadel-Schwindling

Beleg: Gerolstein 5706, Biol. Stat. Weijster 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/310; CE 2/437; RH 325

Mniopetalum* s. *Rimbachia

***Mycena* (Pers.: Fr.) S. F. Gray (Tricholomataceae)**

s. auch *Hemimycena* und *Hydropus*

Mycena abramsii Murr., Voreilender Helmling

= *M. praecox* Vel.

Beleg: Berlingen 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/311; C 2751; RH 364

Mycena acicula (Schaeff.: Fr.) Kumm., Orangeroter Helmling

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/312; C 1889

Mycena adonis (Bull.: Fr.) S. F. Gray, Korallenroter Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/313; C 2359

Mycena aetites (Fr.) Quél., Graublättriger Ruß-Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/315; C 2750

Mycena alcalina s. *M. stipata*

Mycena amicta (Fr.) Quél., Geschmückter Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/318; C 2357; RH 350

Mycena ammoniaca s. *M. leptocephala*

Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél., Orangeschneidiger Helmling

= *M. elegans* (Pers.: Fr.) Kumm.

Beleg: Oos 5705, JF 1980; Oos 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/320; CE 2/501

Mycena avenacea (Fr.) Quél., Braunschneidiger Wiesenhelmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2360

Mycena bulbosa (Cejp) Kühn., Knolliger Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/321; C 2367

Mycena capillaripes Peck, Rußiger Nitratsaftling

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/322; C 2361

Mycena capillaris (Schum.: Fr.) Kumm., Buchenblatt-Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/323; RH 354

Mycena chlorinella s. *M. leptocephala*

Mycena cinerella Karst., Aschgrauer Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/324; C 2362; RH 358

Mycena citrinomarginata Gill., Gelbschneidiger Helmling

vgl. auch var. *sulphurea* Vel.

Nachw.: KR 1B

Mycena crocata (Schrad.: Fr.) Kumm., Gelbmilchender Helmling

Beleg: Berlingen 5706, RIN 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/326; C 1888; RH 347

Mycena cyanorrhiza Quél., Blaufüßiger Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/327; C 2747

Mycena diosma Krglst. et Schwöb.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/328

Mycena elegans s. *M. aurantiomarginata*

Mycena epipterygia (Scop.) S. F. Gray var. *epipterygia*, Dehnbarer Helmling

Beleg: Oos 5705, PJ 1980; Gees 5706, PJ 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/329; CE 2/483; RH 346

Mycena epipterygia var. *viscosa* (Secr.), Schleimiger Helmling

= *M. viscosa* (Secr.) Mre.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/481; RH 346

Mycena erubescens v. Höhn., Bitterer Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/333; C 2746 (rechte Exemplare); RH 349

Mycena filopes (Bull.: Fr.) Kumm., Faden-Helmling

= *M. iodolens* Lund.

(vgl. *M. vitilis*)

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 (als *M. amygdalina*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/334; C 2365

Mycena flavescens Vel., Olivgelber Helmling

Beleg: Gerolstein 5706, L 1971; Hinterhausen 5705, L 1971; Müllenborn 5705, L 1980; Gerolstein 5705, RIN 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/335

Mycena flavoalba (Fr.) Quél., Gelbweißer Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/336; CE 2/491; RH 352

Mycena galericulata (Scop.: Fr.) S. F. Gray, Rosablättriger Helmling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/338

Mycena galopus (Pers.: Fr.) Kumm., Weißmilchender Helmling

vgl. die var. *alba* Fl. Dan. und die var. *nigra* Fl. Dan. (= *M. leucogala* (Cke.) Sacc.)

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/339 und 346; C 2354 (var. *nigra*) und 2355 (var. *alba*); RH 349

Mycena haematopus (Pers.: Fr.) Kumm., Blut-Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/340

Mycena hiemalis (Osbeck: Fr.) Quél., Winter-Rindenhelmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/341

Mycena inclinata (Fr.) Quél., Buntstieliger Helmling

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/342; RH 359

Mycena iodiolens s. *M. filopes*

Mycena leptcephala (Pers.: Fr.) Gill., Stechend-riechender Helmling

=? *M. ammoniaca* (Fr.) Quél.; = *M. chlorinella* (J. Lge.) Sing.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/345; C 2368 und (?)2369 (*M. ammoniaca*)

Mycena longiseta v. Höhn.

Nachw.: KR 1B

Mycena luteoalcalina s. *M. viridimarginata*

Mycena maculata Karst., Gefleckter Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/347; C 1895

Mycena megaspora Kauffm., Torfmoos-Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 358

Mycena metata (Fr.) Kumm., Fleischbräunlicher Helmling

= *M. phyllogena* Pers.

Beleg: Oos 5705, JF 1980; Gerolstein 5705, PJ 1980 (beide als *M. phyllogena*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/349; C 2364; RH 359

Mycena mucor (Batsch: Fr.) Gill., Gefalteter Scheibchen-Helmling

Nachw.: KR 1B

Mycena niveipes (Murr.) Murr.

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: RH 363

Mycena nucicola Huijism.

Nachw.: KR 1B

Mycena olida Bres., Ranziger Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/351

Mycena pearsoniana Dennis ex Sing.

= *M. pseudopura* Cke. ss. Kühn.

Beleg: Müllenborn 5705, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B

Mycena pelianthina (Fr.) Quél., Schwarzgezähnelter Helmling

Belege: leg. et det. B. Oertel 20.09.87, Gees, PE....; leg. et det. B. Oertel 28.09.88, Olk, PE....; Müllenborn 5705, L 1980; Berlingen 5706, RIN 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/352; RH 353

Mycena pelliculosa (Fr.) Quél., Schmieriger Helmling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958

Mycena phyllogena s. *M. metata*

Mycena picta (Fr.: Fr.) Harm., Walzenförmiger Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/353

Mycena polygramma (Bull.: Fr.) S. F. Gray, Rillstieliger Helmling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/355; CE 2/513

Mycena praecox s. *M. abramsii*

Mycena pseudocorticola Kühn., Blaugrauer Rindenhelmling

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, PE...., **Neufund für das Gebiet** - Abb.: BK 3/356

Mycena pseudopura s. *M. pearsoniana*

Mycena pterigena (Fr.: Fr.) Kumm., Farn-Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/357; C 1892; RH 355

Mycena pura (Pers.: Fr.) Kumm., Rettich-Helmling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/358; CE 2/493

Mycena pura var. *rosea* s. *M. rosea*

Mycena purpureofusca (Peck.) Sacc., Lilaschneidiger Helmling

= *M. strobilina* (Pers.: Fr.) Gill. ss. Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 357

Mycena rorida (Scop.: Fr.) Quél., Schleimfuß-Helmling

Beleg: leg. et det. J. Häffner 26.07.86, Moß bei Gerolstein, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/360; RH 347

Mycena rosea (Bull.) Gramberg, Rosa Rettich-Helmling

= *M. pura* (Pers.: Fr.) Kumm. var. *rosea* (Schum.) Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/361; CE 2/495; RH 353

Mycena rosella (Fr.) Kumm., Rosa Helmling

Beleg: Gerolstein 5706, L 1971 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/362; RH 355

Mycena rubromarginata (Fr.: Fr.) Kumm., Rotschneidiger Helmling

Beleg: Gerolstein 5706, L 1971; Gerolstein 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/363; C 1894; RH 357

Mycena sanguinolenta (Alb. et Schw.: Fr.) Kumm., Purpurschneidiger Bluthelmling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/364; CE 2/485

Mycena speirea (Fr.: Fr.) Gill., Bogenblättriger Helmling

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/366; C 1887; RH 351

Mycena stipata Maas Geest. et Schwöb., Viersporiger Nitrat-Helmling

= *M. alcalina* (Fr.) Kumm. pp.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/367; CE 2/519; RH 364

Mycena strobilina s. *M. purpureofusca*

Mycena stylobates (Pers.: Fr.) Kumm., Postament-Helmling

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/369; C 1890; RH 350

Mycena supina (Fr.) Kumm.

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1980 - Nachw.: KR 1B

Mycena tintinnabulum (Fr.) Quél., Winter-Helmling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1896; RH 360

Mycena viridimarginata Karst., Grünschneidiger Helmling

= *M. luteoalcalina* Sing. ss. Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/370; C 1893; RH 356

Mycena viscosa s. *M. epipterygia* var. *viscosa*

Mycena vitilis (Fr.) Quél., Zäher Fadenhelmling

(vgl. *M. filopes*)

Beleg: Gees 5706, JF 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/371; CE 2/507; RH 361

Mycena vulgaris (Pers.: Fr.) Quél., Klebriger Helmling

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1971; Hinterhausen 5705, L 1971 (f. *alba*) - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 2/485; RH 345

Mycena zephirus (Fr.: Fr.) Kumm., Rostfleckiger Helmling

= *M. zephyra*

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/511; RH 361

***Myxomphalia* Hora (Tricholomataceae)**

Myxomphalia maura (Fr.) Hora, Kohlen-Nabeling

= *Fayodia maura* (Fr.) Sing.; = *Omphalia maura* Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/374; RH 367

Naucoria* s. *Alnicola*, *Flammulaster*, *Ramicola* und *Tubaria

***Nyctalis* Fr. (Tricholomataceae)**

[Konidienstadium: *Asterophora* Ditm. in Link: Fr.]

Nyctalis asterophora Fr., Stäubender Zwitterling

Anamorph: *Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditm. in Link: Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/375; CE 2/367; RH 306

Nyctalis parasitica (Bull. Fr.) Fr., Beschleierter Zwitterling

Anamorph: *Asterophora parasitica* (Bull.: Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/376; CE 2/367; RH 306

Omphalia* s. *Fayodia*, *Myxomphalia*, *Omphaliaster*, *Omphalina*, *Phytoconis*, *Pseudoclitocybe*, *Pseudoomphalina* und *Rickenella

Omphalia graveolens* s. *Pseudoomphalina compressipes

***Omphaliaster* Lam. (Tricholomataceae)**

Omphaliaster asterosporus (J. Lge.) Lam.

= *Omphalia asterospora* J. Lge.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/377

***Omphalina* Quél. (Tricholomataceae)**

= *Omphalia* Fr.; s. auch *Phytoconis*

Omphalina abiegna s. *O. grossula*

Omphalina acerosa (Fr.) ??Autor, Grauer Zwergnabeling

= *Arrhenia acerosa* (Fr.) Kühn.; = *Leptoglossum acerosum* (Fr.) Kühn. et Romagn.; = *Leptoglossum glaucum* (Batsch) Karst.; = *Leptoglossum tremulum* (Schaeff.: Fr.) Sing.; = *Pleurotellus tremulus* (Schaeff.: Fr.)

vgl. *O. acerosa* var. *tenella* Kühn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/136; RH 297

Omphalina griseopallida (Desm.) Quél., Grauer Nabeling

= *Arrhenia griseopallida* (Desm.) Kühn. et Lam. ex Court.; = *Leptoglossum griseopallidum* (Desm.) Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/379; C 2405

Omphalina grossula (Pers.) Sing., Gelbgrüner Nabeling

= *Camarophyllus grossulus* (Pers.) Clém.; = *O. abiegna* (Berk. et Br.) Sing.

Beleg: Büscheich 5806, L 1971 (als *O. wynniae*) - Nachw.: KR 1B, Nr. 153 - Abb.: BK 3/75; RH 260

Omphalina hepatica (Fr.: Fr.) Ort., Leberbrauner Nabeling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/380

Omphalina oniscus (Fr.: Fr.) Quél., Gelappter Nabeling

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/382

Omphalina postii (Fr.) Sing.

= *Gerronema postii* (Fr.) Sing.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958

Omphalina rustica (Fr.) Quél. [non ss. Kühn. et Romagn.], Heide-Nabeling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2403; RH 261

Omphalina sphagnicola (Berk.) Mos., Torfmoos-Nabeling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/386; CE 2/141; RH 262 (als *O. philonotis*)

***Omphalotus* Fay. (Paxillaceae)**

Omphalotus olearius (DC.: Fr.) Sing., Leuchtender Ölbaumpilz

= *Clitocybe olearia* (DC.: Fr.) Mre.

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 1/639

***Ossicaulis* Redh. et Ginns (Tricholomataceae)**

Ossicaulis lignatilis (Fr.) ??Autor, Holz-Trichterling

= *Clitocybe lignatilis* (Pers.: Fr.) Karst.; = *Clitocybe lentiginosa* Fr.; = *Pleurotus lignatilis* (Pers.: Fr.) Kumm.

Noch kein Nachweis in der Eifel - Abb.: BK 3/168; CE 2/153; RH 273

***Oudemansiella* Speg. (Tricholomataceae)**

s. auch *Megacollybia* und *Xerula*

Oudemansiella mucida (Schrad.: Fr.) v. Höhn., Beringter Schleimrübling

= *Collybia m.* (Schrad.: Fr.) Quél.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/388; CE 2/457; RH 334

Panaeolina* s. *Panaeolus

***Panaeolus* (Fr.) Quél. (Coprinaceae)**

incl. *Anellaria* Karst. und *Panaeolina* Mre.

Panaeolus acuminatus s. *P. caliginosus*

Panaeolus ater s. *P. fimicola*

Panaeolus caliginosus Jungh., Kegeliges Düngerling

= *P. acuminatus* (Schaeff.: Quél.); = *P. rickenii* Hora

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/191; RH 429

Panaeolus campanulatus s. *P. papilionaceus*

Panaeolus cinctulus Bolt., Dunkelrandiger Düngerling

= *P. subbalteatus* (Berk. et Br.) Sacc.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1746; RH 430

Panaeolus fimicola (Fr.) Gill., Dunkler Düngerling

= *P. ater* (J. Lge.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2215 und 2629; RH 430

Panaeolus fimiputris (Bull.: Fr.) Quél., Ring-Düngerling

= *P. phalaenarum* (Fr.) Quél.; = *P. separatus* (L.) Gill.; = *Anellaria phalaenarum* (Bull.: Fr.); = *Anellaria semiovata* (Sow.: Fr.) Pears. et Dennis

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/195; C 2628 (ringlose Form als *P. antillarum*); RH 431

Panaeolus foeniseccii (Pers.: Fr.) Schröt., Heu-Düngerling

= *Panaeolina foeniseccii* (Pers.: Fr.) Mre.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/193; RH 431

Panaeolus papilionaceus (Bull.: Fr.) Quél., Behangener Düngerling

= *P. campanulatus* (Bull.: Fr.) Quél.; = *P. retirugis* (Fr.) Quél.; = *P. sphinctrinus* (Fr.) Quél.

Beleg: Mürlenbach 5805, L 1971 (als *P. sphinctrinus*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: C 1744; CE 3/187 und 189; RH 429

Panaeolus phalaenarum s. *P. fimiputris*

Panaeolus retirugis s. *P. papilionaceus*

Panaeolus rickenii s. *P. caliginosus*

Panaeolus semiovata s. *P. fimiputris*

Panaeolus separatus s. *P. fimiputris*

Panaeolus sphinctrinus s. *P. papilionaceus*

Panaeolus subbalteatus s. *P. cinctulus*

Panellus Karst. (Tricholomataceae)

incl. *Sarcomyxa* Karst. und *Urosporellina* Horak

Panellus mitis (Pers.: Fr.) Sing., Milder Zwergknäueling

Beleg: leg. et det. B. Oertel 12.11.94, Meckenheim-Altendorf, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/389; CE 2/449; RH 341

Panellus serotinus (Schrader: Fr.) Kühn., Gelbstieliger Muschelseitling

= *Sarcomyxa serotina* (Schrader: Fr.) Karst.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, PE.... - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Pleurotus* s.); FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/403; CE 2/451; RH 341

Panellus stypticus (Bull.: Fr.) Karst. (= *P. stipticus*), Herber Zwergknäueling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Panus* s.); FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/391; CE 2/449; RH 340

***Panus* Fr. (Polyporaceae)**

Panus conchatus s. *P. torulosus*

Panus suavissimus s. *Lentinus* s.

Panus tigrinus s. *Lentinus* t.

Panus torulosus (Pers.: Fr.) Fr., Laubholz-Knäueling

= *P. conchatus* (Bull.: Fr.) Fr.

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 3/241; CE 1/425; RH 207

Panus lecomtei (Fr.) Corner, Borstiger Knäueling

= *P. rudis* Fr.

Nachw.: JAAP, 1910; KR 1A - Abb.: CE 1/421

Panus rudis s. *P. lecomtei*

Paxillus s. unter Röhrlingen und Verwandten

***Phaeocollybia* Heim (Cortinariaceae)**

Phaeocollybia arduennensis Bon, Kleiner Wurzelschnitzling

= *P. hilaris* (Fr.) Heim ss. Horak; = *P. jennyae* (Karst.) Heim ss. Mos.

Nachw.: KR 1B

Phaeocollybia christinae ss. Kühn. et Romagn. s. *P. jennyae*

Phaeocollybia cidaris ss. Mos. s. *P. jennyae*

Phaeocollybia hilaris ss. Horak s. *P. arduennensis*

Phaeocollybia jennyae (Karst.) Heim non ss. Mos., Feuerroter Wurzelschnitzling

= *P. christinae* (Fr.) Heim ss. Kühn. et Romagn. [non ss. Mos.]; = *P. cidaris* (Fr.) Heim ss. Mos.

Nachw.: KR 1B - CE 3/775 (als *P. cidaris*)

Phaeocollybia jennyae ss. Mos. s. *P. arduennensis*

***Phaeogalera* Kühn. (Cortinariaceae)**

Phaeogalera medullosa (Bres.) Mos.

= *Geophila tenax* (Fr.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2636

***Phaeolepiota* Mre.: Konr. et Maubl. (Tricholomataceae ?)**

Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Mre. ex Konr. et Maubl., Goldfarbener Glimmerschüppling

= *Cystoderma aureum* (Matt.: Fr.) Kühn. et Romagn.

Beleg: Rieden 5609, leg. Jungbloed 1992, det. B. Oertel, Neufund für die Eifel - Abb.: CE 3/161; RH 422

***Phaeomarasmius* Scherffel (Strophariaceae)**

Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühn., Weiden-Schüppchenschnitzling

Beleg: leg. et det. G. J. Krieglsteiner 27.07.86, Mosbruch, 5707, PE....; Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/317; RH 462

***Pholiota* (Fr.) Kumm. (Strophariaceae)**

= *Dryophila* Quél.

Pholiota adiposa (Fr.) Kumm., Schleimiger Schüppling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; JAAP, 1910; KR 1B - Abb.: CE 3/295

Pholiota alnicola (Fr.) Sing., Erlen-Schüppling

= *P. amara* (Bull.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2243; CE 3/317; RH 461

Pholiota amara s. *P. alnicola*

Pholiota astragalina (Fr.) Sing., Safranroter Schüppling

Beleg: Gerolstein 5706, HA 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 461

Pholiota aurivella s. *P. cerifera*

Pholiota carbonaria (Fr.: Fr.) Sing., Kohlen-Schüppling

= *P. highlandensis* (Peck) A. H. Smith et Hesler

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Flammula* c.); KR 1B - Abb.: CE 3/311; RH 459

Pholiota cerifera (Karst.) Karst., Hochthronender Schüppling

= *P. aurivella* (Batsch: Fr.) Kumm.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: RH 457

Pholiota curvipes s. *P. tuberculosa*

Pholiota decussata s. *P. lubrica*

Pholiota destruens s. *P. populnea*

Pholiota flammans (Fr.) Kumm., Feuer-Schüppling

Beleg: leg. et det. B. Oertel 01.08.88, Hilberath, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/287; RH 456

Pholiota flavida (Schff.: Fr.) Sing., Schwefelgelber Schüppling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Flammula* f.); KR 1B

Pholiota gummosa (Lasch) Sing., Strohblasser Schüppling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/307; RH 458

Pholiota highlandensis s. *P. carbonaria*

Pholiota jahnii Tjallingi et Bas, Pinsel-Schüppling

= *P. muelleri* (Fr.) Ort.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/299; RH 457

Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Sing., Tonweißer Schüppling

Beleg: Gerolstein 5706, HA 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/305; RH 458

Pholiota lubrica (Pers.: Fr.) Sing., Weißflockiger Schüppling

= *P. decussata* (Fr.) Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1762 und 1763

Pholiota lucifera (Lasch) Quél., Fettiger Schüppling

(vgl.: *P. tuberculosa*)

Beleg: Gerolstein 5705, Tj 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/303

Pholiota mixta (Fr.) Kuyper et Tjall., Weg-Schüppling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Flammula m.*) - Abb.: RH 460

Pholiota muelleri s. *P. jahnii*

Pholiota myosotis (Fr.: Fr.) Sing., Olivgelber Scheinschüppling

= *Dryophila m.* (Fr.: Fr.) Kühn. et Romagn.; = *Hypholoma m.* (Fr.: Fr.) Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2634; RH 450

Pholiota populnea (Pers.: Fr.) Kuyper et Tjallinga, Pappel-Schüppling

= *P. destruens* (Brondeau) Gill.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/289; RH 454

Pholiota spumosa (Fr.) Sing., Nadel-Schüppling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/309; RH 460

Pholiota squarrosa (Pers.: Fr.) Kumm., Sparriger Schüppling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/291; RH 456

Pholiota tuberculosa (Schaeff.: Fr.) Kumm.

= *P. curvipes* (Fr.) Quél.

(vgl. *P. lucifera*)

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 455

Pholiotina s. *Conocybe*

Phylloporus s. unter Röhrlingen und Verwandten

***Phyllotopsis* Gilb. et Donk: Sing. (Polyporaceae)**

Phyllotopsis nidulans (Pers.: Fr.) Sing., Orangeseitling

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 3/393; CE 1/407; RH 205

***Phytoconis* Bory de St. Vincent (Tricholomataceae)**

Zum Teil mit bei *Omphalina* untergebracht

Phytoconis ericetorum (Pers.: Fr.) Redhead et Kuyper, Gefalteter Nabeling

= *Gerronema e.* (Pers.: Fr.) Sing.; = *Omphalia umbellifera* Pers.: Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/212; RH 259

Phytoconis grisella s. *P. velutina*

Phytoconis pseudandrosacea s. *P. velutina*

Phytoconis umbellifera s. *P. ericetorum*

Phytoconis velutina (Quél.) Redhead et Kuyper

= *Omphalina grisella* Weinm.; = *Omphalina pseudandrosacea* (Bull.: St. Am.) Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2401

Pleurotellus* s. *Cheimonophyllum*, *Crepidotus*, *Omphalina* oder *Phyllotus

***Pleurotus* (Fr.) Kumm. (Polyporaceae)**

Pleurotus columbinus s. *P. ostreatus*

Pleurotus cornucopiae (Paul.: Pers.) Roll., Rillstieliger Seitling

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 1/413

Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) Kumm., Berindeter Seitling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: BK 3/395; CE 1/421; RH 206

Pleurotus lignatilis s. *Ossicaulis* l.

Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm., Austernseitling

= *P. columbinus* Quél. in Bres.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: BK 3/397; C 2447 (als *P. salignus*); CE 1/409 und 411

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél., Löffelförmiger Seitling

Nachw.: KR 1A - Abb.: CE 1/407; RH 206

***Pluteus* Fr. (Pluteaceae)**

Pluteus alborugosus s. *P. inquilinus*

Pluteus atricapillus s. *P. cervinus*

Pluteus atromarginatus s. *P. nigroflocculosus*

Pluteus cervinus (Schaeff.) Kumm., Rehrauner Dachpilz

= *P. atricapillus* (Batsch) Fay.; =? *P. pouzarianus* Sing.

Beleg: Berlingen 5706, L 1980 (als *P. atricapillus*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: RH 391

Pluteus chrysophaeus (Schaeff.: Fr.) Quél. [non ss. Kühn. et Romagn.]

= *P. galerooides* Ort.; = *P. luteovirens* Rea

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1875; CE 2/593 (?)

Pluteus chrysophaeus ss. Kühn. et Romagn. s. *P. phlebophorus*

Pluteus cinereofuscus J. Lge., Graubrauner Dachpilz

= *P. olivaceus* Ort.; = *P. godeyi* Gill. ss. J. Lge.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/595

Pluteus cinereus s. *P. thomsonii*

Pluteus depauperatus s. *P. plautus*

Pluteus ephebeus (Fr.: Fr.) Gill.

= *P. lepiotoides* Pears.; = *P. murinus* Bres. ss. Romagn.; = *P. pearsonii* Ort.; = *P. robertii* (Fr.) Karst. ss. Reid; = *P. villosus* (Bull.) ??Autor ss. Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/589 und 591

Pluteus exiguus (Pat.) Sacc.

Beleg: Büscheich 5806, L 1971 - Nachw.: KR 1B

Pluteus galerooides s. *P. chrysophaeus*

Pluteus godeyi s. *P. cinereofuscus*

Pluteus granulatus s. *P. plautus*

Pluteus griseopus s. *P. nanus* f. *griseopus*

Pluteus hiatulus s. *P. plautus*

Pluteus inquilinus Romagn.

= *P. alborugosus* Kühn. ap. Kühn. et Romagn.

Beleg: Berlingen 5706, L 1980 (als *P. alborugosus*) - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81

Pluteus insidiosus Vellinga et Schreurs

Nachw.: KR 1B

Pluteus leoninus (Schaeff.: Fr.) Kumm., Löwengelber Dachpilz

= *P. luteomarginatus* Roll.; = *P. sororiatatus* (Karst.) Karst.

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/583 oben und unten

Pluteus lepiotooides s. *P. ephebeus*

Pluteus luctuosus Boud.

= *P. marginatus* (Quél.) Bres.

Nachw.: KR 1B

Pluteus luteomarginatus s. *P. leoninus*

Pluteus luteovirens s. *P. chrysophaeus*

Pluteus lutescens s. *P. romellii*

Pluteus marginatus s. *P. luctuosus*

Pluteus minutissimus s. *P. podospileus*

Pluteus murinus s. *P. ephebeus*

Pluteus nanus (Pers.: Fr.) Kumm. f. *nanus*

= *P. satur* Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2343

Pluteus nanus f. *griseopus* (Ort.) Vellinga

= *P. griseopus* Ort.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2341

Pluteus nigroflocculosus (R. Schulz.) Fav., Schwarzschneidiger Dachpilz

= *P. atromarginatus* (Sing.) Kühn.

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, L 1980 (als *P. atromarginatus*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958;
KR 1B - Abb.: RH 390

Pluteus olivaceus s. *P. cinereofuscus*

Pluteus pallescens Ort.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2342

Pluteus pearsonii s. *P. ephebeus*

Pluteus pellitus (Pers.: Fr.) Kumm., Weißer Dachpilz

Nachw.: KR 1B

Pluteus phlebophorus (Ditm.: Fr.) Kumm.

= *P. chrysophaeus* (Schaeff.: Fr.) Quél. ss. Kühn. et Romagn.

Belege: Oos 5705, CH 1980; Heiligenstein bei Gerolstein 5706, L 1971; Müllenborn 5705, L 1980 - Nachw.:
KR 1B - Abb.: CE 2/597

Pluteus plautus (Weinm.) Gill.

= *P. depauperatus* Romagn.; = *P. granulatus* Bres.; = *P. hiatulus* Romagn.; = *P. punctipes* Ort.; = *P. semibulbosus* (Lasch) Gill. ss. auct. non ss. J. Lge.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1874, 2339 und 2340; CE 2/587

Pluteus podospileus Sacc. ex Cub.

= *P. minutissimus* Mre.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2345 und 2346

Pluteus pouzarianus s. *P. cervinus*

Pluteus punctipes s. *P. plautus*

Pluteus robertii s. *P. ephebeus*

Pluteus romellii (Britz.) Sacc., Gelbstieliger Dachpilz

= *P. lutescens* (Fr.) Bres.; = *P. splendidus* Pears.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1876; RH 392

Pluteus roseipes v. Höhn.

Beleg: Gerolstein 5706, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/581

Pluteus salicinus (Pers.: Fr.) Kumm., Grauer Dachpilz

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, L 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: C 2335

Pluteus satur s. *P. nanus* f. *nanus*

Pluteus semibulbosus s. *P. plautus*

Pluteus sororiatus s. *P. leoninus*

Pluteus splendidus s. *P. romellii*

Pluteus thomsonii (Berk. et Br.) Dennis

= *P. cinereus* Quél.

Beleg: Berlingen 5706, L 1980; Reisrod b. Gees 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1878

Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) Kumm., Schwarzflockiger Dachpilz

Beleg: Berlingen 5706, L 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2336; CE 2/585

Pluteus villosus s. *P. ephebeus*

Psalliota s. *Agaricus*

Psathyrella (Fr.) Quél. (Coprinaceae)

= *Drosophila* Quél.; = *Psathyra* (Fr.) Kumm.

Psathyrella albidula s. *P. prona*

Psathyrella appendiculata s. *P. piluliformis*

Psathyrella artemisiae (Pass.) Konr. et Maubl.

= *P. jerdonii* (Berk. et Br.) Konr. et Maubl. ss. Kühn. et Romagn.; = *P. squamosa* (Karst.) Mos.

Nachw.: KR 1B

Psathyrella atomata s. *P. prona*

Psathyrella badiophylla (Romagn.) Mos.

Nachw.: FUCHS, 1993 (Erstnachweis für die Eifel)

Psathyrella badiovestita s. *P. microrrhiza*

Psathyrella bipellis (Quél.) A. H. Smith, Purpurfarbiger Mürbling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2192 und 2197 (als *P. barlae*)

Psathyrella calcarea s. *P. prona*

Psathyrella candolleana (Fr.) Mre., Behangener Faserling

=? *P. coronata* (Fr.); =? *P. microlepidota* Ort.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Hypholoma candolleanum*); FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/225; C (?)2198 (als *P. microlepidota*); RH 433

Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konr. et Maubl., Medusenhaupt

Beleg: Monschau 5403, L 1971 - Nachw.: KR 1B

Psathyrella cernua s. *P. sarcocephala*

Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.) Pears. et Dennis

= *P. subatrata* (Batsch) Gill.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/197

Psathyrella coronata s. *P. candolleana*

Psathyrella corrugis (Pers.: Fr.) Konr. et Maubl., Rosaschneidiger Faserling

= *P. gracilis* (Fr.) Quél.

(vgl. *P. pseudogracilis*)

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (möglicherweise nicht von *P. pseudogracilis* unterschieden); KR 1B - Abb.: CE 3/199 und 221; RH 432

Psathyrella cortinarioides s. *P. frustulenta*

Psathyrella cotonea (Quél.) Konr. et Maubl.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2200; CE 3/213

Psathyrella exalbicans s. *P. spadiceogrisea*

Psathyrella frustulenta (Fr.) A. H. Smith, Zimtblättriger Mürbling

= *P. cortinarioides* Ort.

Nachw.: KR 1B

Psathyrella fulvescens (Romagn.) A. H. Smith

Nachw.: KR 1B

Psathyrella fusca (Schum.: Fr.) Pears.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2624

Psathyrella gossypina (Bull.: Fr.) Pears. et Dennis

= *P. xanthocystis* Ort.

Nachw.: KR 1B

Psathyrella gracilis s. *P. corrugis*

Psathyrella hydrophila s. *P. piluliformis*

Psathyrella jerdonii s. *P. artemisiae*

Psathyrella maculata (Park.) A. H. Smith, Fleckiger Saumpilz

= *P. scobinacea* (Fr.) Sing.

Beleg: Büscheich 5806, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1735

Psathyrella mammifera s. *P. spadiceogrisea*

Psathyrella marcescibilis (Britz.) Sing.

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: CE 3/201

Psathyrella melanthina (Fr.) Kits v. Wav.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2199

Psathyrella microlepidota s. *P. candolleana*

Psathyrella microrrhiza (Lasch: Fr.) Konr. et Maubl., Wurzelnder Zärtling

= *P. badiovestita* Ort.; = *P. semivestita* (Berk. et Br.) A. H. Smith

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/199

Psathyrella multipedata (Peck) A. H. Smith, Büscheliger Faserling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/217; RH 433

Psathyrella obtusata (Fr.) A. H. Smith

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 - Abb.: CE 3/227

Psathyrella obtusata var. *vernalis* s. *P. spadiceogrisea*

Psathyrella orbitarum s. *P. prona*

Psathyrella pennata (Fr.) Pears. et Dennis, Kohlen-Mürbling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2201

Psathyrella picta s. *P. prona*

Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) Ort., Weißstieliges Stockschwämmchen

= *P. appendiculata* (Bull.) Mre. et Wern.; = *Drosophila appendiculata* var. *pilulaeformis*; = *P. hydrophila* (Bull.: Mér.) Mre.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Hypholoma hydrophilum*); KR 1B - Abb.: CE 3/219; RH 434

Psathyrella polycystis Romagn.

Nachw.: KR 1B

Psathyrella prona (Fr.) Gill., Weg-Zärtling

= *P. albidula* (Romagn.) Mos.; = *P. atomata* (Fr.) Qué. ss. Bres., ss. J. Lge.; = *P. calcarea* (Romagn.) Mos.; = *P. orbitarum* (Romagn.) Mos.; = *P. picta* (Romagn.) Bon; ? = *P. torpens* (Fr.) Konr. et Maubl.; = *P. vinosofulva* Ort.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *P. atomata*); KR 1B - Abb.: C 2194; CE 3/201

Psathyrella pseudogracilis (Romagn.) Mos.

(vgl. *P. corrugis*)

Beleg: leg. et det. B. Oertel 17.10.89, Rinnen, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2619

Psathyrella pygmaea (Bull.: Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/197

Psathyrella pyrotricha s. *Lacrymaria lacrymabunda*

Psathyrella sarcocephala (Fr.) Sing. ss. orig.

= *Drosophila cernua* ss. Kühn. et Romagn.; = *P. cernua* (Vahl: Fr.) Mos. ss. Mos.

Nachw.: KR 1B

Psathyrella sarcocephala ss. Mos. s. *P. spadicea*

Psathyrella scobinacea s. *P. maculata*

Psathyrella semivestita s. *P. microrrhiza*

Psathyrella spadicea (Schaeff.) Sing., Schokoladenbrauner Zärtling

= *P. sarcocephala* (Fr.) Sing. ss. Mos.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: CE 3/205 und 203 (als *P. sarcocephala*); RH 432

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.: Fr.) Mre.

= *P. exalbicans* (Romagn.) Bon; = *P. mammifera* Romagn.; = *P. obtusata* (Fr.) A. H. Smith var. *vernalis* J. Lge.; = *P. vernalis* (J. Lge.) Mos.

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B

Psathyrella squamosa s. *artemisiae*

Psathyrella subatrata s. *P. conopilus*

Psathyrella subcernua (Schulz.) Sing.

Nachw.: FUCHS, 1993 (Erstfund für ??Deutschland)

Psathyrella torpens s. *P. prona*

Psathyrella velutina s. *Lacrymaria lacrymabunda*

Psathyrella vernalis s. *P. spadiceogrisea*

Psathyrella vinosofulva s. *P. prona*

Psathyrella xanthocystis s. *P. gossypina*

***Pseudoclitocybe* (Sing.) Sing. (Tricholomataceae)**

Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.: Fr.) Sing., Kaffeebrauner Gabeltrichterling

= *Omphalia* c. (Bull.: Fr.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993 (als *Cantharellula* c.); KR 1B - Abb.: BK 3/399; CE 2/369; RH 308

***Pseudoomphalina* (Sing.) Sing. (Tricholomataceae)**

Pseudoomphalina compressipes (Peck) Sing., Ranziger Scheinnabeling

= *Omphalia graveolens* Peters.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1913; RH 307

***Psilocybe* (Fr.) Kumm. (Strophariaceae)**

= *Geophila* Qué. pp.

Psilocybe atrorufa s. *P. montana*

Psilocybe bullacea (Bull.: Fr.) Kumm., Blasiger Kahlkopf

Nachw.: KR 1B

Psilocybe crobula s. *P. inquilina* var. *crobula*

Psilocybe inquilina (Fr.: Fr.) Bres. var. *inquilina*

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 453

Psilocybe inquilina var. *crobula* (Fr.), Weißflockiger Kahlkopf

= *P. crobula* (Fr.) M. Lge. ex Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/285

Psilocybe montana (Pers.: Fr.) Kumm., Trockener Kahlkopf

= *Geophila atrorufa* (Schaeff.: Fr.)

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 453

Psilocybe semilanceata (Fr.) Kumm., Spitzkegeliger Kahlkopf

Beleg: leg. et det. B. Oertel 16.11.86, Meckenheim-Ersdorf, nur 1 Exemplar, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1753; RH 451

***Ramicola* Vel. (Cortinariaceae)**

= *Simocybe* Karst. pp.

(z.T. zu *Naucoria* gestellt)

Ramicola centunculus (Fr.) Vel., Buchen-Schnitzling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1765; RH 466

Ramicola haustellaris (Fr.: Fr.) Watl., Ästchen-Schnitzling

= *Crepidotus haustellaris* (Fr.: Fr.) Kumm.; = *R. rubi* (Berk.) Watl.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2723

Ramicola rubi s. *R. haustellaris*

Ramicola sumptuosa (Ort.) Watl.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1764

***Resupinatus* S. F. Gray (Tricholomataceae)**

s. auch *Hohenbuehelia*

Resupinatus trichotis (Pers.) Sing., Flaumiger Zwergseitling

=? *R. applicatus* (Batsch: Fr.) S. F. Gray; = *Geopetalum rhacodium* (Berk. et Curt.) Kühn. et Romagn.;

=? *Geopetalum striatulum* (Fr.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/400; CE 2/447 (*R. applicatus*); RH 339

***Rhodocybe* Mre. (Entolomataceae)**

Rhodocybe fallax (Quél.) Sing., Weißlicher Bitterling

= *Clitopilus fallax* (Quél.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2316

Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper et Noord., Würziger Tellerling

= *R. truncata* (Quél.) Bon; = *Clitopilus truncatus* (Quél.) Kühn. et Romagn.

Beleg: Oos 5705, L 1980 (als *R. truncata*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/569; RH 371

Rhodocybe mundula s. *R. popinalis*

Rhodocybe nitellina (Fr.) Sing., Gelbfuchsigiger Tellerling

= *Rhodopaxillus nitellinus* (Fr.) Sing.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 03.10.87, Müllenborn, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/571; RH 372

Rhodocybe popinalis (Fr.) Sing., Bereifter Tellerling

= *R. mundula* (Lasch: Fr.) Sing.; = *Clitopilus mundulus* Lasch: Fr.; = *Clitopilus popinalis* Fr.

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980 (als *Rhodocybe mundula*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1855; CE 2/571; RH 373

Rhodocybe truncata s. *R. gemina*

Rhodopaxillus s. *Lepista*

Rhodopaxillus nitellinus s. *Rhodocybe nitellina*

Rhodophyllus s. *Entoloma*

***Rickenella* Raithelh. (Tricholomataceae)**

Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raith., Gemeiner Heftelnabeling

= *Omphalia fibula* Bull.: Fr.

Nachw.: FUCHS, 1993; JAAP, 1910; KR 1B - Abb.: BK 3/401; CE 2/147; RH 264

Rickenella setipes (Fr.: Fr.) Raith., Violettstieliger Heftelnabeling

= *Omphalia swartzii* Fr.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/402; RH 264

Rickenella swartzii s. *R. setipes*

***Rimbachia* Pat. (Tricholomataceae)**

= *Mniopetalum* Donk et Sing.

Rimbachia bryophila (Pers.: Fr.) Redhead

= *Leptoglossum bryophilum* (Pers. Fr.) Rick.

Beleg: Berlingen 5706, L 1980 (als *Mniopetalum bryophilum*) - Nachw.: KR 1B

***Ripartites* Karst. (Tricholomataceae ?)**

Ripartites helomorphus (Fr.) Karst., Gebuckelter Filzkrempling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1919

Ripartites metrodii Huijism.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/66; CE 2/209

Ripartites strigiceps s. *R. tricholoma*

Ripartites tricholoma (Alb. et Schw.: Fr.) Karst., Bewimperter Filzkrempling

= *R. strigiceps* (Fr.) Karst.

Belege: leg. et det. B. Oertel 06.09.86, Sötenich, PE....; leg. et det. B. Oertel 31.10.92, Remagen, PE....; Oos 5705, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/67; C 1918; RH 280

Rozites Karst. (Cortinariaceae)

Rozites caperatus (Pers.: Fr.) Karst., Reifpilz

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Pholiota c.*); KR 1B - Abb.: CE 3/769; RH 524

Russula s. bei den Sprödblättlern

Sarcomyxa s. *Panellus*

Simocybe s. *Ramicola*

Strobilurus Sing. (Tricholomataceae)

(z.T. mit zu *Collybia* gestellt)

Strobilurus esculentus (Wulf.: Fr.) Sing., Fichtenzapfen-Rübling

Beleg: Gerolstein 5705, Biol. Stat. Weijster 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/405; RH 337

Strobilurus stephanocystis (Hora) Sing., Milder Kiefernzapfen-Rübling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/406; RH 337

Strobilurus tenacellus (Pers.: Fr.) Sing., Bitterer Kiefernzapfen-Rübling

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/407

Stropharia (Fr.) Quél. (Strophariaceae)

= *Geophila* Quél. pp.

Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.) Quél., Grünspan-Träuschling

Beleg: Mürlenbach 5805, L 1971 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/255; RH 442

Stropharia albocyanea (Desm.: Fr.) Quél., Bläulicher Träuschling

=? *S. ochrocyanea* Bon

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2212 (*S. ochrocyanea*); RH 443 (als *S. pseudocyanea*)

Stropharia albonitens (Fr.) Karst., Hyalinweißer Träuschling

Nachw.: KR 1B

Stropharia caerulea Kreis., Blauer Träuschling

= *S. cyanea* (Bolt.) Tuom.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/257; RH 442

Stropharia coronilla (Bull.: Fr.) Quél., Krönchen-Träuschling

Beleg: Gerolstein 5705, HA 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/253; RH 441

Stropharia cyanea s. *S. caerulea*

Stropharia depilata s. *S. hornemannii*

Stropharia hornemannii (Weinm.: Fr.) Lund. et Nannf., Üppiger Träuschling

= *Geophila depilata* (Pers.: Fr.) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/263; RH 444

Stropharia inuncta (Fr.) Quél., Purpurgrauer Träuschling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2213; RH 443

Stropharia luteonitens (Vahl: Fr.) Quél., Riechender Träuschling

= *Geophila umbonatescens* (Peck) Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B

Stropharia melasperma (Bull.: Fr.) Quél.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1743

Stropharia ochrocyanea s. *S. albocyanea*

Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) Quél., Halbkugeliger Träuschling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/265; RH 441

Stropharia squamosa (Pers.: Fr.) Quél. var. *squamosa*, Schuppiger Träuschling

Beleg: Büscheich 5806, L 1971 - Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 444

Stropharia squamosa var. *thrausta* (Schulz. ap. Kalchbr.) Masee

= *S. thrausta* (Schulz. ap. Kalchbr.) Sacc.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/253

Stropharia thrausta s. *S. squamosa* var. *thrausta*

Stropharia umbonatescens s. *S. luteonitens*

Tephrocybe s. *Lyophyllum*

***Tricholoma* (Fr.) Staude (Tricholomataceae)**

s. auch *Tricholomopsis*

Tricholoma acerbum (Bull.: Fr.) Quél., Gerippter Ritterling

Beleg: leg. et det. Oertel 28.09.88, Mürlenbach 5805, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/408; CE 2/229

Tricholoma aestuans Fr.

Nachw.: KR 1B

Tricholoma albobrunneum s. *T. striatum*

Tricholoma album ss. auct. s. *T. stiparophyllum*

Tricholoma album ss. Kühn. et Romagn. s. *T. lascivum*

Tricholoma apium s. *T. luteovirens*

Tricholoma argyraceum (Bull.) Gill. var. *argyraceum*, Gilbender Ritterling

= *T. scalpturatum* (Fr.) Quél.

Beleg: Gerolstein 5706, HA 1980; Berlingen 5706, Tj 1980 (beide als *T. scalpturatum*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/431; CE 2/293; RH 293

Tricholoma argyraceum var. *inocybeoides* (Pears.) Krglst.

= *T. inocybeoides* Pears.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2412

Tricholoma atosquamosum (Chev.) Sacc., Schwarzschruppiger Ritterling

= *T. squarulosum* Bres.

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/411; CE 2/301 und 303; RH 294 und 295

Tricholoma aurantium (Schaeff.: Fr.) Rick., Orangeroter Ritterling

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, HA 1980; Gerolstein 5706, JF 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/412; RH 286

Tricholoma auratum s. *T. equestre*

Tricholoma batschii s. *T. fracticum*

Tricholoma boreale s. *Lyophyllum incarnatobrunneum*

Tricholoma bufonium s. *T. sulphureum*

Tricholoma cingulatum (Fr.) Jacobasch, Beringter Ritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/416; RH 295

Tricholoma civile s. *Lyophyllum incarnatobrunneum*

Tricholoma columbetta (Fr.) Kumm., Seidiger Ritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/417; CE 2/275; RH 292

Tricholoma coryphaeum s. *T. sejunctum*

Tricholoma equestre (L.) Kumm., Grünling

= *T. auratum* (Paul.: Fr.) Gill.; = *T. flavovirens* (Pers.: Fr.) Lund. ss. auct. non Fr.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/418; CE 2/231 und 251; RH 288

Tricholoma flavobrunneum s. *T. fulvum*

Tricholoma flavovirens (Pers.: Fr.) Lund. ss. orig., Olivgrüner Ritterling

= *T. joachimi* Bon et Riva; = *T. malluvium* (Batt. Sacc.) ss. Bres.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/253

Tricholoma flavovirens ss. auct. s. *T. equestre*

Tricholoma focale (Fr.) Rick., Halsband-Ritterling

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: CE 2/219 und 221 (als *T. robustum*); RH 285

Tricholoma fracticum (Britz.) Kreis., Fastberingter Ritterling

= *T. batschii* Gulden; = *T. subannulatum* (Batsch) Bres. non Peck

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, Tj 1980; Gerolstein 5705, RIN 1980 (als *T. batschii*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/419; CE 2/227; RH 282

Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc. non Bull., Gelbblättriger Ritterling

= *T. flavobrunneum* (Fr.) Kumm.; = *T. nictitans* (Fr.) Gill.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 31.10.87, Mürtenbach 5805, unter *Picea*, PE....(als *T. nictitans*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/420; CE 2/231 und 233; RH 285

Tricholoma helviodor s. *T. luteovirens*

Tricholoma imbricatum (Fr.: Fr.) Kumm., Feinschuppiger Ritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/421; RH 286

Tricholoma inamoenum (Fr.) Quél., Lästiger Ritterling

Beleg: Oos 5705, CH 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/422; CE 2/267; RH 291

Tricholoma inocybeoides s. *T. argyraceum* var. *inocybeoides*

Tricholoma irinum s. *Lepista irina*

Tricholoma joachimi s. *T. flavovirens* ss. orig.

Tricholoma lascivum (Fr.) Gill., Unverschämter Ritterling

= *T. album* Schaeff.: Fr. ss. Kühn. et Romagn.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/423

Tricholoma luteovirens (Alb. et Schw.: Fr.) Rick., Sellerie-Ritterling

= *T. apium* J. Schff.; = *T. helviodor* Pil. et Svrc.; = *T. apium* var. *helviodor* (Pil. et Svrc.) Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1923; CE 2/263; RH 290

Tricholoma malluvium s. *T. flavovirens* ss. orig.

Tricholoma myomyces (Pers.: Fr.) J. Lge.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/297

Tricholoma nictitans s. *T. fulvum*

Tricholoma orirubens Quél., Rötender Ritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/425; CE 2/289 und 291

Tricholoma pardalotum Herink et Kotl., Tiger-Ritterling

= *T. pardinum* (Pers.) Quél. ss. auct. non Pers.; = *T. tigrinum* (Schaeff.: Fr.) Kumm. ss. auct. non Fr.

Beleg: Gees 5706, RIN 1980 (als *T. pardinum*) - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/426; CE 2/305

Tricholoma pardinum s. *T. pardalotum*

Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél., Getropfter Ritterling

= *T. tridentinum* Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1921; CE 2/235; RH 284

Tricholoma populinum J. Lge., Pappel-Ritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/427; CE 2/237; RH 283

Tricholoma portentosum (Fr.) Quél., Schwarzfaseriger Ritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/428; CE 2/247; RH 288

Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél., Lärchen-Ritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/429; CE 2/241; RH 287

Tricholoma pseudoalbum s. *T. stiparophyllum*

Tricholoma ramentaceum (Bull.: Fr.) Rick.

Nachw.: KR 1B

Tricholoma saponaceum (Fr.) Kumm., Seifenritterling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/430; C 2772 (var. *squamosum*) und 2773 (f. *griseofolia*);
RH 292

Tricholoma sculpturatum s. *T. argyraceum* var. *argyraceum*

Tricholoma sciodes (Pers.) Mart., Schärflicher Ritterling

= *T. virgatum* (Fr.: Fr.) Kumm. var. *sciodes* (Secr.)

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/432; C 1927

Tricholoma sejunctum (Sow.: Fr.) Quél., Grüngelber Ritterling

=? *T. coryphaeum* (Fr.) Gill.; = *T. subsejunctum* Peck; = *T. viridilutescens* Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/433; CE 2/255, 257 (*T. coryphaeum*) und 259; RH 289

Tricholoma squarrulosum s. *T. atosquamosum*

Tricholoma stiparophyllum (Lund.) Karst., Strohblasser Ritterling

= *T. album* (Schaeff.: Fr.) Kumm. ss. auct., non ss. Kühn. et Romagn.; = *T. pseudoalbum* Bon

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/435; CE 2/269 und 271; RH 291

Tricholoma striatum (Schaeff.) Sacc., Weißbrauner Ritterling

= *Tricholoma albobrunneum* (Pers.: Fr.) Kumm.

Nachw.: KR 1B - Abb.: RH 284

Tricholoma subannulatum s. *T. fracticum*

Tricholoma subsejunctum s. *T. sejunctum*

Tricholoma sudum (Fr.) Quél. ss. J. Lge. (non ss. Joss., non ss. Kühn. et Romagn.), Falbgrauer Ritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1926

Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) Kumm., Schwefelritterling

=? *T. bufonium* (Pers.: Fr.) Gill.

Belege: leg. et det. B. Oertel 05.10.91, Kottenforst bei Bonn-Röttgen, PE....; Müllenborn 5705, Biol. Stat. Weijster 1980; Gindorf 5905, PJ 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 1B - Abb.: BK 3/437; CE 2/261 oben und 261 unten (*T. bufonium*); RH 290

Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) Kumm., Erdritterling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; JAAP, 1910; KR 1B - Abb.: BK 3/438; CE 2/307; RH 294

Tricholoma tigrinum s. *T. pardalotum*

Tricholoma tridentinum s. *T. pessundatum*

Tricholoma ustale (Fr.: Fr.) Kumm., Brandiger Ritterling

Beleg: Gindorf 5905, Biol. Stat. Weijster 1980; Hinterhausen 5705, JF 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/439; RH 283

Tricholoma ustaloides Romagn., Braunweißgestielter Ritterling

Beleg: leg. B. Oertel 14.10.90, Mürlenbach 5805, det. F. Benjaminsen, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/440; C 1920; RH 282

Tricholoma vaccinum (Pers.: Fr.) Kumm., Bärtiger Ritterling

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, PJ 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/441; CE 2/243; RH 287

Tricholoma virgatum (Fr.: Fr.) Kumm., Brennender Ritterling

Belege: leg. et det. B. Oertel 02.10.87, Mürlenbach 5805, PE....; Berlingen 5706, Tj 1980 - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/442; CE 2/287; RH 293

Tricholoma virgatum var. *sciodes* s. *T. sciodes*

Tricholoma viridilutescens s. *T. sejunctum*

***Tricholomopsis* Sing. (Tricholomataceae)**

(früher z.T. mit zu *Tricholoma* gestellt)

Tricholomopsis decora (Fr.) Sing., Olivgelber Holzritterling

Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/444; CE 2/215; RH 281

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Sing., Rötlicher Holzritterling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: BK 3/445; RH 281

***Tubaria* (W. G. Smith) Gill. (Strophariaceae)**

z.T. zu *Naucoria* gestellt; s. auch *Flammulaster ferrugineus*

Tubaria autochthona s. *T. dispersa*

Tubaria conspersa (Pers.: Fr.) Fay., Flockiger Trompetenschnitzling

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2658; RH 465

Tubaria dispersa (Pers.) Sing., Gelblättriger Trompetenschnitzling

= *T. autochthona* (Berk. et Br.) Sacc.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 2226; RH 465

Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gill., Gemeiner Trompetenschnitzling

=? *T. hiemalis* Romagn.: Bon

Nachw.: FUCHS, 1993 (als *T. hiemalis*); KR 1B - Abb.: CE 3/321 unten und oben (*T. hiemalis*)

Tubaria hiemalis s. *T. furfuracea*

Tubaria minutalis Romagn.

Beleg: Gerolstein 5705, PJ 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1B - Abb.: CE 3/323

Tubaria pallidospora J. Lge., Blaßsporiger Trompetenschnitzling

Nachw.: KR 1B

Tubaria pellucida (Bull.: Fr.) Gill.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 3/323

Urosporellina s. *Panellus*

Volvariella Speg. (Pluteaceae)

Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Sing., Wolliger Scheidling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/603; RH 389

Volvariella cinerascens s. *V. murinella*

Volvariella gloiocephala (DC.: Fr.) Boekh. et End., Großer Scheidling

= *V. speciosa* (Fr.: Fr.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/601; RH 388

Volvariella hypopithys (Fr.) Shaffer, Nadeln-Scheidling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/609; RH 389

Volvariella murinella (Quél.) Mos. non ss. Kühn. et Romagn.

=? *V. cinerascens* (Bres.) Mos.

Nachw.: KR 1B - Abb.: C 1703

Volvariella parvula ss. Kühn. et Romagn. s. *V. pusilla* var. *taylori*

Volvariella plumulosa s. *V. pusilla* var. *taylori*

Volvariella pusilla (Pers.: Fr.) Sing. var. *pusilla*, Kleinster Scheidling

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/609

Volvariella pusilla var. *taylori* (Berk.) Boekhout

= *V. parvula* (Wein.) Speg. ss. Kühn. et Romagn.; = *V. plumulosa* (Lasch ex Oudemans) Sing. ss. Lge.; = *V. taylori* (Berk.) Sing.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/611

Volvariella speciosa s. *V. gloiocephala*

Volvariella taylori s. *V. pusilla* var. *taylori*

***Xeromphalina* Kühn. et Mre. ap. Konr. et Maubl. (Tricholomataceae)**

Xeromphalina campanella (Batsch: Fr.) Mre., Geselliger Glückchennabeling

Nachw.: FUCHS, 1993 (Erstnachweis für die Eifel) - Abb.: BK 3/446; RH 369

***Xerula* Mre. (Tricholomataceae)**

(z.T. mit zu *Collybia* oder *Oudemansiella* gestellt)

Xerula causei Mre., Schwarzbrauner Wurzelrübling

= *X. nigra* (Dörf.) Dörf.; = *Oudemansiella renati* Clém.

Nachw.: KR 1B - Abb.: CE 2/451

Xerula longipes s. *X. pudens*

Xerula nigra s. *X. causei*

Xerula pseudoradicata s. *X. radicata*

Xerula pudens (Pers.) Sing., Braunhaariger Samtrübling

= *Oudemansiella longipes* (Bull.: St. Am.) Mos.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 19.09.87, Eschweiler, PE.... - Nachw.: KR 1B - Abb.: BK 3/449; CE 2/461

Xerula radicata (Rehhan: Fr.) Dörf., Wurzel-Schleimrübling

=? *Oudemansiella pseudoradicata* Mos.

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, Biol. Stat. Weijster 1980 (als *Oudemansiella radicata*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; JAAP, 1910 (als *Collybia macroua*); KR 1B - Abb.: BK 3/450; CE 2/453; RH 335

Xerula renati s. *X. caussei*