

## Ascomycetes

### ***Acanthonitschkea* Speg. (Nitschkiaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

### ***Acrospermum* Tode ex Fr. (Acrospermataceae)**

*Acrospermum compressum* Tode: Fr., Fadensporiges Flachkeulchen

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/302; C 2141; RH 676

### ***Aleuria* Fuck. (Humariaceae)**

*Aleuria aurantia* (Pers.: Fr.) Fuck., Gemeiner Orangebecherling

NACHW.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Peziza a.*); FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/98; CE 4/465

### ***Allophylaria* (Karst.) Karst. (Leotiaceae)**

*Allophylaria filicum* (Phill.) Svrc.

Nachw.: KR 2

### ***Anthracobia* Boud. (Humariaceae)**

*Anthracobia macrocystis* (Cke.) Boud., Fastbehaarter Brandstellenbecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/94; C 2107

*Anthracobia maurilabra* s. *A. melaloma*

*Anthracobia melaloma* (Alb. et Schw.: Fr.) Boud., Schwarzgesäumter Brandstellenbecherling

= *A. maurilabra* (Cke.) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/96; C 2106; CE 4/465

### ***Antinoa* Vel. (Hyaloscyphaceae)**

*Antinoa strobilina* (Fr.: Fr.) Velen.

(vgl. *Ciboria rufofusca*)

Nachw.: KR 2

*Apiocrea* s. *Hypomyces*

*Apostemidium* s. *Vibrissea*

### ***Arpinia* Berthet (Pyronemataceae)**

noch kein Nachweis in der Eifel

***Ascobolus* Pers.: Fr. (Ascobolaceae)**

*Ascobolus atrofuscus* s. *A. carbonarius*

*Ascobolus behntziensis* Kirschst.

Nachw.: KR 2

*Ascobolus carbonarius* Karst.

= *A. atrofuscus* Phill. et Plowr.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/112

*Ascobolus furfuraceus* Pers. ex Fr., Kleiiger Kotling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/114; C 2935

*Ascobolus geophilus* Seav.

Nachw.: KR 2

***Ascocorticium* Bref. et Tavel (Ascocorticaceae)**

*Ascocorticium anomalum* (Ellis et Harkn.) Schröt., Schlauch-Rindenpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/130

***Ascocoryne* Groves et Wilson (Leotiaceae)**

= *Coryne* Nees

*Ascocoryne cylichnium* (Tul.) Korf, Großsporiger Gallertbecher

= *Coryne urnalis* (Nyl.) Sacc.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/166; C 2084 und 2964; RH 644

*Ascocoryne sarcoides* (Jacq.: Fr.) Groves et Wilson, Fleischroter Gallertbecher

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/167; RH 644

*Ascocoryne urnalis* s. *A. cylichnium*

*Ascophanus* s. *Iodophanus* und *Thelebolus*

***Ascotremella* Seav. (Leotiaceae)**

*Ascotremella faginea* (Peck) Seav., Schlauch-Zitterling

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/165; C 2116

***Balsamia* Vitt. (Balsamiaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Belonioscypha* s. *Cyathicula***

***Bertia* de Not. (Nitschkiaceae)**

*Bertia moriformis* (Tode: Fr.) de Not., Maulbeer-Kugelpilz

Beleg: Oos 5705, JG 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/373; CE 4/541

***Biscogniauxia* s. *Hypoxylon***

***Bisporella* Sacc. (Leotiaceae)**

*Bisporella citrina* (Batsch: Fr.) Korf et Carp., Zitronengelbes Holzbecherchen

= *Calycella* c. (Batsch: Fr.) Boud.

(vgl. *Hymenoscyphus epiphyllus*)

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/175; RH 646

*Bisporella resinicola* (Baranyay et Funk) Carp. et Seifert

Nachw.: KR 2, Nr. 330

***Botryosphaeria* Ces. et de Not. (Botryosphaeriaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Botryotinia* Whetzel (Sclerotiniaceae)**

= *Sclerotinia* Fuck.

*Botryotinia ficariarum* Henneb. in Henneb. et Groves

Nachw.: KR 2

***Boudiera* Cke. (Ascobolaceae)**

*Boudiera acanthospora* Schum. et Diss.

Nachw.: KR 2

*Boudiera areolata* Cke. et Phill.

Nachw.: KR 2

***Bulgaria* Fr. (Leotiaceae)**

*Bulgaria inquinans* (Pers.) Fr., Schmutzbecherling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *B. polymorpha*); FUCHS, 1993; JAAP, 1910 (als *B. polymorpha*); KR 2 - Abb.: BK 1/170; CE 4/505; RH 645

***Byssonectria* Karst. (Humariaceae)**

vgl. *Kotlabaea*

*Byssonectria carbonigena* s. *B. fusispora*

*Byssonectria fusispora* (Berk.) Rogerson et Korf, Spindelsporiger Becherling

= *Inermisia f.* (Berk.) Rifai; = *Octospora carbonigena* (Berk.) Dennis

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/102; C 2931; RH 631 (als *B. aggregata*)

*Byssonectria semiimmersa* (Karst.) Benkert

Nachw.: KR 2

***Caloscypha* Boud. (Humariaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Calospora* Sacc. (Diaporthaceae)**

= *Calosporella* Schröt., = *Prosthecium* Fres. pp.

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

*Calycella* s. *Bisporella*

***Calycellina* v. Höhn. (Hyaloscyphaceae)**

*Calycellina fagina* (A. Schmidt et Arendholz) Baral in Baral et Krglst.

Nachw.: KR 2

*Calycellina lachnobrachya* (Desm.) Baral in Baral et Krglst.

Nachw.: KR 2

***Calycina* Nees ex S. F. Gray (Hyaloscyphaceae)**

*Calycina herbarum* (Pers.: Fr.) S. F. Gray, Krautstengel-Becherling

= *Helotium h.* (Pers.: Fr.) Fr.; = *Hymenoscyphus h.* (Pers.: Fr.) Dennis

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/186; C 2965

***Camarops* Karst. (Xylariaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Capitotricha* (Raitviir) Baral in Baral et Krglst. (Hyaloscyphaceae)**

*Capitotricha bicolor* (Bull. ex Mér.: Fr.) Baral in Baral et Krglst., Zweifarbiges Haarbecherchen  
= *Dasyscyphus b.* (Bull. ex Mér.: Fr.) Fuck.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/214; CE 4/515; RH 655

*Capitotricha fagiseda* Baral

Nachw.: KR 2

**Catinella Boud. (Leotiaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

**Cenangium Fr. (Leotiaceae)**

*Cenangium ferruginosum* Fr., Gelbbrauner Kiefern-Korkbecherling

= *C. farinaceum* (Pers.) Rehm; = *C. ferrugineum* Fr.: Fr.

Nachw.: KR 2 - Abb.: RH 650

**Cheilymenia Boud. (Humariaceae)**

*Cheilymenia coprinaria* s. *C. fimicola*

*Cheilymenia crucipila* (Cke. et Phill. in Cke.) Le Gal, Sternhaariger Erdborstling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/85; CE 4/463

*Cheilymenia fimicola* (de Not. et Baglietto) Dennis, Gemeiner Mistborstling

= *C. coprinaria* (Cke.) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/86

*Cheilymenia oligotricha* (Karst.) Moravec, Dottergelber Erdborstling

= *C. vitellina* (Pers.) Dennis

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/89

*Cheilymenia raripila* (Phill.) Dennis

Nachw.: KR 2; Lit.: DENNIS, 1981, Nachtrag S. 4

*Cheilymenia stercorea* (Pers.) Boud., Sternhaariger Mistborstling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/87; CE 4/461

*Cheilymenia theleboides* (Alb. et Schw.: Fr.) Boud., Blaßgelber Erdborstling

**Beleg:** Gerolstein 5705, HA 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/88; C 2553

*Cheilymenia vitellina* s. *C. oligotricha*

**Chlorencoelia Dixon (Leotiaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Chlorociboria* Seav. emend. Dixon (Leotiaceae)**

*Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex Ramam., Korf et Batra, Grünspanbecherling

= *Chlorosplenium a.* (Nyl.) Karst.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/199; CE 4/509; RH 648

*Chlorociboria aeruginosa* (Pers.: Fr.) Seav. ex Ramam., Korf et Batra, Großsporiger Grünspanbecherling

= *Chlorosplenium aerugineum* (Berk.) Sacc.

**Beleg:** Hinterhausen 5705, WG 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: RH 648

***Chloroscypha* Seav. (Leotiaceae)**

*Chloroscypha alutipes* (Phill.) Dennis

Nachw.: KR 2

***Chlorosplenium* s. *Chlorociboria***

***Choiromyces* Vitt. (Terfeziaceae)**

*Choiromyces maeandriiformis* Vitt., Mäandertrüffel

= *Ch. meandriiformis*

Nachw.: KR 2 - Abb.: CE 4/489; RH 605

***Ciboria* Fuck. (Sclerotiniaceae)**

*Ciboria amentacea* (Balbis: Fr.) Fuck., Kätzchen-Becherling

=? *C. caucus* (Rebent.: Pers.) Fuck.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/146; C 2960; RH 654 (*C. caucus*)

*Ciboria batschiana* s. *C. calyculus*

*Ciboria calyculus* (Batsch: Purton) Hengstm., Brauner Eichel-Stromabecherling

= *C. batschiana* (Zopf in Zopf et Sydow) Buchw.

Nachw.: KR 2 - Abb.: CE 4/499

*Ciboria caucus* s. *C. amentacea*

*Ciboria rufofusca* (Weberbauer) Sacc., Zapfenschuppen-Becherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/147

***Ciborinia* Whetzel (Sclerotiniaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Cistella* Qué. (Hyaloscyphaceae)**

*Cistella dentata* (Pers.: Fr.) Qué.

Nachw.: KR 2

*Cistella granuloseella* (P. Karst.) Nannf.

Nachw.: KR 2

*Cistella hymeniophila* (Karst.) Korf

Nachw.: KR 2, Nr. 872

***Claviceps* Tul. (Clavicipitaceae)**

*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul., Mutterkorn

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/308; C 2985; RH 660

***Colpoma* Wallr. (Rhytismataceae)**

*Colpoma quercinum* (Pers. ex St. Am.: Fr.) Wallr., Eichen-Schildbecherling

Nachw.: JAAP, 1910 (als *Dichaena quercina*); KR 2 - Abb.: BK 1/293; CE 4/523

***Coprobria* Boud. (Humariaceae)**

*Coprobria granulata* (Bull.: Fr.) Boud., Körniger Rinderdung-Becherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/101; C 2108

***Cordierites* s. *lonomidotis***

***Cordyceps* (Fr.) Link (Clavicipitaceae)**

*Cordyceps gracilis* Durieu et Mont., Raupen-Kernkeule

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/310; RH 663

*Cordyceps militaris* (L.: Fr.) Link, Orangegelbe Puppen-Kernkeule

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/311; CE 4/527; RH 662

*Cordyceps ophioglossoides* (Ehrhart: Pers.) Link, Zungen-Kernkeule

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/312; CE 4/525; RH 661

***Coronophora* Fuck. (Nitschkiaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Coryne* s. *Ascocoryne***

***Creopus* Link (Hypocreaceae)**

*Creopus gelatinosus* (Tode: Fr.) Link, Grüner Kissenpustelpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/320; C 2127; RH 666

***Crocicreas* Fr. (Leotiaceae)**

*Crocicreas megalosporum* (Rea) Carp.

= *Cyathicula megalospora* (Rea) Dennis

Nachw.: KR 2, Nr. 25

***Crumenula* s. *Crumenulopsis***

***Crumenulopsis* Groves (Leotiaceae)**

= *Crumenula* Rehm

*Crumenulopsis pinicola* (Rebent.) Groves

Nachw.: KR 2

*Crumenulopsis sororia* (Karst.) Groves

Nachw.: KR 2

***Cucurbitaria* S. F. Gray (Cucurbitariaceae)**

*Cucurbitaria berberidis* (Pers.: St. Am.) S. F. Gray, Berberitzen-Kugelpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/385; C 3031

***Cudonia* Fr. (Geoglossaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Cudoniella* Sacc. (Leotiaceae)**

*Cudoniella acicularis* (Bull.: Fr.) Schröt., Dünnstieliger Kreisling



= *Helotium aciculare* (Bull.) Pers.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/179; C 2117; RH 646

*Cudoniella clavus* (Alb. et Schw.: Fr.) Dennis, Wasser-Kreisling

= *Helotium c.* (Alb. et Schw.) Gill.

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/180; CE 4/509

*Cudoniella tenuispora* (Cke. et Mass.) Dennis

Nachw.: KR 2

### ***Cyathicula* de Not. (Leotiaceae)**

*Cyathicula coronata* (Bull. ex Mér.) de Not. in Karst., Gekrönter Stengelbecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/191

*Cyathicula cyathoidea* (Bull. ex Mér.: Fr.) de Thuemen, Pokalförmiger Stengelbecherling

= *Phialea c.* (Bull. ex Mér.) Gill.

Nachw.: JAAP, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/192

*Cyathicula megalospora* s. *Crocicreas megalosporum*

*Cyathipodia* s. *Helvella corium*, *dissingii* oder *macropus*

### ***Daldinia* Ces. et de Not. (Xylariaceae)**

*Daldinia concentrica* (Bolt.: Fr.) Ces. et de Not., Kohliger Kugelpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/346; C 2982 (als *D. vernicosa*)

*Dasyobolus* s. *Ascobolus*

### ***Dasyscyphella* Tranzschel (Hyaloscyphaceae)**

*Dasyscyphella angustipila* Raitviir

Nachw.: KR 2

*Dasyscyphella crystallina* (Fuck.) Raitviir

= *Dasyscyphus crystallinus* (Fuck.) Sacc.

Nachw.: KR 2

*Dasyscyphella nivea* (Hedwig: Fr.) Raitviir, Schneeweißes Haarbecherchen

= *Dasyscyphus niveus* (Hedwig: Fr.) Sacc.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/223; C 2971

*Dasyscyphus angustipilus* s. *Dasyscyphella angustipila*

*Dasyscyphus bicolor* s. *Capitotricha b.*

*Dasyscyphus cerinus* s. *Neodasyscypha cerina*

*Dasyscyphus crystallinus* s. *Dasyscyphella crystallina*

*Dasyscyphus fagisedus* s. *Capitotricha fagiseda*

*Dasyscyphus inquilinus* s. *Psilachnum inquilinum*

*Dasyscyphus mollissimus* s. *Trichopeziza mollissima*

*Dasyscyphus niveus* s. *Dasyscyphella nivea*

*Dasyscyphus sulfureus* s. *Trichopeziza sulphurea*

### ***Dematioscypha* Svrc. (Hyaloscyphaceae)**

*Dematioscypha richonis* (Boud.) Huhtinen var. *olivacea* (Vel.) Huhtinen

Nachw.: KR 2

### ***Desmazierella* Libert (Sarcoscyphaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

### ***Diaporthe* Nitschke (Diaporthaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

### ***Diatrype* Fr. (Diatrypaceae)**

*Diatrype bullata* (Hoffm.: Fr.) Fr., Blasiges Eckenscheibchen

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/356; C 2137; RH 675

*Diatrype disciformis* (Hoffm.: Fr.) Fr., Buchen-Eckenscheibchen

Nachw.: FUCHS, 1993; JAAP, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/357; CE 4/541; RH 674

*Diatrype flavovirens* (Pers.: Fr.) Fr., Gelbgrüner Krustenkugelpilz

= *Eutypa f.* (Pers.: Fr.) Tul. et C. Tul.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/354

*Diatrype stigma* (Hoffm.: Fr.) Fr., Flächiges Eckenscheibchen

Nachw.: JAAP, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/358; CE 4/539

***Diatrypella* (Ces. et de Not.) de Not. (Diatrypaceae)**

*Diatrypella favacea* s. *D. verruciformis*

*Diatrypella quercina* (Pers.: Fr.) Cke., Eichen-Eckenscheibchen

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2568

*Diatrypella verruciformis* (Ehrh. ex Pers.) Nitschke, Warziges Eckenscheibchen

= *D. verrucaeformis*; =? *D. favacea* (Fr.) Sacc.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/360; C 3010 (*D. verruciformis*) und 3009 (*D. favacea*)

***Discina* s. *Gyromitra***

***Discinella* Boud. (Leotiaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Disciotis* Boud. (Morchellaceae)**

*Disciotis venosa* (Pers.: Fr.) Arnaud, Morchel-Becherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/10; CE 4/413; RH 610

***Dothiora* Fr. emend Fuck. (Dothioraceae)**

= *Dothidella* Speg.

noch kein Nachweis in der Eifel

***Dumontinia* Kohn (Sclerotiniaceae)**

= *Sclerotinia* Fuck.

*Dumontinia tuberosa* (Bull. ex Mér.) Kohn, Anemonen-Becherling

= *Sclerotinia t.* (Hedw.: Fr.) Fuck.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/145; CE 4/499; RH 652

***Durella* Tul. et C. Tul. (Leotiaceae)**

*Durella macrospora* Fuckel, Großsporiges Hartbecherchen

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/207

***Elaphomyces* Nees: Fr. (Elaphomycetaceae)**

*Elaphomyces granulatus* Fr., Kleinwarzige Hirschtrüffel

Nachw.: KR 2 - Abb.: CE 4/543

*Elaphomyces muricatus* Fr., Spitzwarzige Hirschtrüffel

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 3019 und 3018 (als *E. muricatus* f. *variegatus*); RH 607

***Encoelia* (Fr.) Karst. (Leotiaceae)**

*Encoelia fimbriata* Spooner et Trigaux

Nachw.: KR 2

*Encoelia furfuracea* (Roth: Pers.) Karst., Kleiiger Büschelbecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/204; C 2118; RH 650

***Epichloe* (Fr.) Tul. (Clavicipitaceae)**

*Epichloe typhina* (Pers.: Fr.) Tul. et C. Tul., Gras-Kernpilz

Nachw.: JAAP, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/315; RH 663

***Eutypa* Tul. et C. Tul. (Diatrypaceae)**

*Eutypa flavovirens* s. *Diatrype* f.

*Eutypa maura* (Fr.: Fr.) Fuck., Ahorn-Kohlenkrustenpilz

= *E. acharii* Tul. et C. Tul.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/353; C 3012

***Eutypella* (Nitschke) Sacc. (Diatrypaceae)**

*Eutypella prunastri* (Pers.: Fr.) Sacc.

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2136

*Eutypella quaternata* (Pers.: Fr.) F. Rappaz

= *Quaternaria qu.* (Pers.: Fr.) Schröt.

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 3015

*Fabraea* s. *Leptotrochila*

***Fenestella* Tul et C. Tul. (Fenestellaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Fimaria* Vel. (Humariaceae)**

*Fimaria theioleuca* (Roll.) v. Brumm., Schwefelgelber Dungbecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/110

***Flavoscypha* Harm. (Pezizaceae)**

*Flavoscypha cantharella* (Fr.) Harm., Zitronengelber Öhrling

= *Otidea c.* (Fr.) Sacc.; = *Otidea concinna* (Pers.) Sacc.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/62; C 2922

***Genea* Vitt. (Geneaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Geoglossum* Pers.: Fr. (Geoglossaceae)**

*Geoglossum cookeianum* Nannf.

Nachw.: KR 2 - Abb.: CE 4/491

*Geoglossum fallax* Dur.

Nachw.: KR 2

*Geoglossum glutinosum* Pers.: Fr.

= *G. viscosum* Pers.

Nachw.: KR 2

*Geoglossum nigratum* s. *G. umbratile*

*Geoglossum simile* Peck

leg. B. Oertel, M. Schröder, Tüttenberg, W. Luck 14.08.94, Blankenheim-Waldorf, Heidemoor auf dem Heidekopf III, in Gesellschaft von *Hygrocybe lepida*, det. S. Woike, **Neufund für die Eifel**

*Geoglossum umbratile* Sacc.

= *G. nigratum* Cke.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/132; RH 637

*Geoglossum viscosum* s. *G. glutinosum*

***Geopora* Harkn. (Humariaceae)**

= *Sepultaria* (Cke.) Lamb.

*Geopora arenicola* (Lév.) Kers, Sandborstling

= *Sepultaria arenosa* (Fuck.) Rehm

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/67; C 2101 und 2923; RH 628

*Geopora foliacea* (Schaeff.: Boud.) Ahmad

Nachw.: KR 2

*Geopora tenuis* (Fuck.) Boud.

**Beleg:** Gerolstein 5705, HA 1980; Berlingen 5706, RS 1980 (beide als *Sepultaria t.*) - Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2549

***Geopyxis* (Pers.: Fr.) Sacc. (Humariaceae)**

*Geopyxis carbonaria* (Alb. et Schw.: Fr.) Sacc., Kohlenbecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/100; CE 4/467; RH 630

*Geopyxis rehmii* Tournau

Nachw.: KR 2

***Gloeotinia* Wilson, Noble et Gray (Sclerotiniaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Gloniopsis* de Not. (Hysteriaceae)**

*Gloniopsis praelonga* (Schw.) Zogg.

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 3033 (als *G. levantica*)

***Glyphium* Nitschke ex Lehmann (Mytiliniaceae)**

*Glyphium elatum* (Grev.) Zogg., Keilförmiger Kohlenpilz

= *Lophium e.* Grev.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/389; C 3037

***Godronia* Mougeot et Lév. (Leotiaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

## **Gyromitra Fr. (Helvellaceae)**

*Gyromitra ancilis* (Pers.: Fr.) Kreis., Großer Scheibling

= *Discina perlata* (Fr.) Fr.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/31; CE 4/435; RH 614

*Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr., Frühjahrs-Lorchel

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Helvella e.*); KR 2 - Abb.: BK 1/11; CE 4/431; RH 611

*Gyromitra gigas* (Krbh.) Cke., Riesen-Lorchel

= *Maublancomyces g.* (Krbh.) Herter

Nachw.: KR 2; Lit.: DENNIS, 1981, S. 7 und Nachtrag S. 1 - Abb.: BK 1/12; CE 4/441; RH 613

*Gyromitra perlata* s. *G. ancilis*

*Helotium aciculare* s. *Cudoniella acicularis*

*Helotium albidum* s. *Hymenoscyphus albidus*

*Helotium calyculus* s. *Hymenoscyphus c.*

*Helotium clavus* s. *Cudoniella c.*

*Helotium consobrinum* s. *Hymenoscyphus menthae*

*Helotium epiphyllum* s. *Hymenoscyphus epiphyllum*

*Helotium fructigenum* s. *Hymenoscyphus fructigenus*

*Helotium fructigenum* var. *carpini* s. *Hymenoscyphus fructigenus* var. *c.*

*Helotium herbarum* s. *Calycina h.*

*Helotium imberbe* s. *Hymenoscyphus imberbis*

*Helotium lutescens* s. *Hymenoscyphus l.*

*Helotium menthae* s. *Hymenoscyphus m.*

*Helotium novum* s. *Hymenoscyphus epiphyllum*

*Helotium peruni* s. *Hymenoscyphus p.*

*Helotium robergei* s. *Hymenoscyphus albidus*

*Helotium salicellum* s. *Hymenoscyphus salicellus*

*Helotium scutula* s. *Hymenoscyphus s.*

*Helotium serotinum* s. *Hymenoscyphus serotinus*

*Helotium tenuisporum* s. *Cudoniella tenuispora*

*Helotium tuba* s. *Hymenoscyphus calyculus*

*Helotium umbilicatum* s. *Hymenoscyphus epiphyllum*

## **Helvella L.: St. Am. (Helvellaceae)**

*Helvella acetabulum* (L.: St. Am.) Quél., Hochgerippte Lorchel

= *Paxina acetabulum* (L.) O. Kuntze; = *Paxina barlae* (Boud.) Seav.; = *Paxina sulcata* (Pers.) O. Kuntze

**Beleg:** leg. et det. B. Oertel 27.06.87, Heiligenstein bei Gerolstein, PE.... (als *H. unicolor*) - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Acetabula vulgaris*); KR 2 - Abb.: BK 1/25; CE 4/429; RH 616

*Helvella albipes* s. *H. spadicea*

*Helvella arctica* s. *H. corium*

*Helvella atra* Holmsk.: Fr., Schwarze Lorchel

= *Leptopodia a.* (König: Fr.) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/19; CE 4/425; RH 619

*Helvella barlae* s. *H. acetabulum*

*Helvella capucina* s. *H. elastica*

*Helvella confusa* Harm., Kurzgerippte Lorchel

= *H. solitaria* Karst. ss. Dissing

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2915; RH 617

*Helvella corium* (Weberb.) Mass., Schwarze Becherlorchel

= *Cyathipodia c.* (Weberb.) Boud.; = *Cyathipodia arctica* (Nannf.) Mos.

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2913; RH 618

*Helvella crispa* Fr., Herbst-Lorchel

= *H. pallescens* Schaeff.; = *H. pithyophila* Boud.

**Beleg:** Gerolstein 5706, RS 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/14; CE 4/413 und 415; RH 621

*Helvella dissingii* Korf, Wolligfilziger Langfüßler

= *Cyathipodia villosa* (Hedw.: O. Kuntze) Boud.

**Beleg:** Heiligenstein b. Gerolstein 5706, RS 1980 (als *H. villosa*) - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/24; C 2912

*Helvella dupainii* s. *H. solitaria*

*Helvella elastica* Bull. ex St. Am., Elastische Lorchel

= *Leptopodia e.* (Bull.) Boud.; = *Leptopodia capucina* (Quél.) Boud.; = *Leptopodia pulla* (Holmsk.) Boud.

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/20; CE 4/423

*Helvella ephippium* Lév., Sattel-Lorchel

= *Leptopodia e.* (Lév.) Boud.

**Beleg:** Oos 5705, JG 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/21; C 2911



*Helvella lacunosa* Afz.: Fr., Gruben-Lorchel

= *H. sulcata* Afz.

**Beleg:** Gerolstein 5706, RS 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 2 - Abb.: BK 1/16; C 2087; CE 4/419  
oben und unten

*Helvella latispora* Boud., Bläßgraue Sattellorchel

= *Leptopodia stevensii* (Peck) Le Gal

**Beleg:** Berlingen 5706, JG 1980; Berlingen 5706, RS 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/21; C 2914; CE 4/427;  
RH 620

*Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf., Schwarzweißer Rippenbecherling

= *Paxina leucomelas* (Pers.) O. Kuntze

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/27

*Helvella macropus* (Pers.: Fr.) Karst., Grauer Langfüßler

= *Cyathipodia m.* (Pers.: Fr.) Dennis; = *Macroscyphus m.* Pers. ex S. F. Gray

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Peziza m.*); KR 2 - Abb.: BK 1/22; CE 4/427; RH 618

*Helvella monachella* s. *H. spadicea*

*Helvella pallescens* s. *H. crispa*

*Helvella pithyophila* s. *H. crispa*

*Helvella platypodia* s. *H. solitaria*

*Helvella pulla* s. *H. elastica*

*Helvella queletii* s. *H. solitaria*

*Helvella solitaria* Karst. (non ss. Dissing), Rippenstielige Becherlorchel

= *H. queletii* Bres.; = *Paxina dupainii* (Boud.) Seav.; = *Paxina platypodia* (Boud.) Seav.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/18; CE 4/421; RH 617

*Helvella solitaria* ss. Dissing s. *H. confusa*

*Helvella spadicea* Schaeff., Weißstielige Lorchel

= *Leptopodia albipes* (Fuck.) Boud.; = *Leptopodia monachella* (Scop.: Fr.) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: CE 4/423

*Helvella stevensii* s. *H. latispora*

*Helvella sulcata* s. *H. acetabulum* und *lacunosa*

*Helvella villosa* s. *H. dissingii*

**Heyderia** (Fr.) Link (Leotiaceae)

*Heyderia abietis* (Fr.) Link, Nadel-Haubenpilz

= *Mitrula a.* Fr.

**Beleg:** Oos 5705, RS 1980 - Nachw.: FRENCKEN 1980/81 - Abb.: BK 1/140; C 2980

***Holwaya* Sacc. (Leotiaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Humaria* Fuck. (Humariaceae)**

*Humaria hemisphaerica* (Weber in Wiggers: Fr.) Fuck., Halbkugeliger Borstling

**Beleg:** Berlingen 5706, JG 1980; Berlingen 5706, RS 1980 (beide als *Mycolachnea h.*) - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/72; RH 628

*Humaria livida* s. *Trichophaea l.*

***Hyalopeziza* Fuck. (Hyaloscyphaceae)**

*Hyalopeziza raripila* (v. Höhn.) Huhtinen

Nachw.: KR 2

***Hyaloscypha* Boud. (Hyaloscyphaceae)**

*Hyaloscypha aureliella* (Nyl.) Huhtinen

Nachw.: KR 2

*Hyaloscypha intacta* Svrcek

Nachw.: KR 2

***Hydnobolites* Tul. (Terfeziaceae)**

*Hydnobolites cerebriformis* Tul., Gläserne Hirntrüffel

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/126; C 2957

***Hydnotria* Berk. et Br. (Pseudotuberaceae)**

= *Hydnotrya*

*Hydnotria tulasnei* (Berk. et Br.) Berk. et Br., Rotbraune Rasentrüffel

Nachw.: KR 2 - Abb.: CE 4/473; C 2946 (als *H. carnea*); RH 606

***Hymenoscyphus* S. F. Gray (Leotiaceae)**

= *Helotium* Fr. 1849; vgl. *Phaeohelotium*

*Hymenoscyphus albidus* (Rob. ex Desm.) Phill., Weißes Stengelbecherchen

= *Helotium robergei* Dennis

**Beleg:** Berlingen 5706, L 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/181

*Hymenoscyphus calyculus* (Sow.: Fr.) Phill., Kelchförmiges Stengelbecherchen

= *Helotium tuba* (Bolt.) Fr.

**Beleg:** Hinterhausen 5705, CH 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/182; C 2559; RH 647

*Hymenoscyphus consobrinus* s. *H. menthae*

*Hymenoscyphus epiphyllus* (Pers.: Fr.) Rehm ex Kaufm.

= *Helotium novum* Vel.; = *Phaeohelotium umbilicatum* (Le Gal) Dennis

(vgl. *Bisporella citrina*)

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/174; C 2966

*Hymenoscyphus fructigenus* (Bull. ex Mér.: Fr.) S. F. Gray var. *fructigenus*, Eichen-Fruchtschalenbercherling

**Beleg:** Gerolstein 5705, HA 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/185

*Hymenoscyphus fructigenus* var. *carpini* (Batsch ex Rabenh. in Rabenh.) Hengstm.

Nachw.: KR 2

*Hymenoscyphus herbarum* s. *Calycina* h.

*Hymenoscyphus imberbis* (Bull.: Fr.) Dennis

**Beleg:** Hinterhausen 5705, CH 1980 - Nachw.: KR 2

*Hymenoscyphus lutescens* (Hedw.: Fr.) Phill.

**Beleg:** Gerolstein 5705, HA 1980 - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81

*Hymenoscyphus menthae* (Phill.) Baral in Baral et Krglst.

= *Helotium consobrinum* Boud.

Nachw.: KR 2

*Hymenoscyphus novus* s. *H. epiphyllus*

*Hymenoscyphus peruni* (Vel.) Svrcek

Nachw.: KR 2

*Hymenoscyphus robergei* s. *H. albidus*

*Hymenoscyphus salicellus* (Fr.) Dennis

Nachw.: KR 2

*Hymenoscyphus scutula* (Pers.: Fr.) Phill., Schildförmiger Stengelbecherling

**Beleg:** Gerolstein 5705, RS 1980 (als *Helotium* s.) - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/190; CE 4/511

*Hymenoscyphus serotinus* (Pers.: Fr.) Phill.

Nachw.: KR 2

*Hymenoscyphus tuba* s. *H. calyculus*

*Hymenoscyphus umbilicatus* s. *H. epiphyllus*

### ***Hypocrea* Fr. (Hypocreaceae)**

*Hypocrea citrina* (Pers.: Fr.) Fr., Gelber Kissenpustelpilz

= *H. lactea* (Fr.: Fr.) Fr.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/317; C 2989; RH 665

*Hypocrea fungicola* Karst., Birkenporling-Kissenpustelpilz

= *H. pulvinata* Fuck.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/318; C 2990; RH 665

*Hypocrea lactea* s. *H. citrina*

*Hypocrea pulvinata* s. *H. fungicola*

*Hypocrea rufa* (Pers.: Fr.) Fr., Rotbrauner Kissenpustelpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/319; C 2988; RH 664

### ***Hypocreopsis* Karst. ((Hypocreaceae))**

*Hypocreopsis lichenoides* (Tode: Fr.) Seav.

Nachw.: KR 2 - Abb.: RH 666

***Hypoderma* DC. ex St. Am. emend. De Not. (Rhytismataceae)**

*Hypoderma rubi* (Pers. ex Chev.: Fr.) De Not.

= *H. virgultorum* DC.

Nachw.: KR 2

***Hypomyces* Tul. (Hypomycetaceae)**

*Hypomyces aurantius* (Pers.: Fr.) Tul., Orangegelber Schmarotzerpustelpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/323; C 2991

*Hypomyces chrysospermus* Tul.

= *Apiocrea chrysosperma* (Tul.) Sydow

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 1976

*Hypomyces lateritius* (Fr.: Fr.) Tul.

= *Peckiella lateritia* (Fr.) Mre.

**Beleg:** Gerolstein 5705, HA 1980; Gerolstein 5705, WG 1980 (beide als *Peckiella lateritia*) - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81 - Abb.: CE 4/241 (als *P. deformans*)

*Hypomyces odoratus* G. Arnold

**Beleg:** Hinterhausen 5705, WG 1980 - Nachw.: KR 2

*Hypomyces rosellus* (Alb. et Schw.: Fr.) Tul.

Nachw.: KR 2

*Hypomyces viridis* (Alb. et Schw.) Berk. et Br., Grüner Schmarotzerpustelpilz

= *Peckiella* v. (Alb. et Schw.) Sacc.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/322

***Hypoxyton* Bull.: Fr. (Xylariaceae)**

*Hypoxyton cohaerens* (Pers.: Fr.) Fr.

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2999

*Hypoxyton crustaceum* s. *H. multiforme*

*Hypoxyton deustum* (Hoffm.: Fr.) Grev., Brandiger Krustenpilz

= *Ustulina deusta* (Fr.) Petrak

Nachw.: JAAP, 1910?? (als *Ustulina ??maxima*); KR 2 - Abb.: BK 1/345; RH 671

*Hypoxyton fragiforme* (Scop.: Fr.) Kickx, Rötliche Kohlenbeere

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/338; CE 4/539; RH 670

*Hypoxyton fuscum* (Pers.: Fr.) Fr., Rotbraune Kohlenbeere

Nachw.: JAAP, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/339; CE 4/537

*Hypoxyton howeanum* Peck

= *H. howeanum*

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2132

*Hypoxyton multiforme* (Fr.: Fr.) Fr., Vielgestaltige Kohlenbeere

= *H. crustaceum* (Sow.) Nitschke

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/341; C 2997; RH 671

*Hypoxyton nummularium* Bull.

= *Biscogniauxia nummularia* (Bull.: Fr.) O. Kuntze

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 3004

*Hypoxyton rubiginosum* (Pers.: Fr.) Fr., Ziegelrote Kohlenkruste

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/342; C 3000; RH 670

*Hypoxyton serpens* (Pers.: Fr.) Kickx, Gewundene Kohlenbeere

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/343; C 3002

***Hysterium* DC. ex Mér. (Hysteriaceae)**

*Hysterium pulicare* Pers.: Fr., Gemeiner Spaltkohlenpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/387

***Hysterographium* Corda (Hysteriaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

*Inermisia* s. *Byssonectria*

***Ionomidotis* Durand ex Thaxter (Leotiaceae)**

= *Cordierites* Mont.

*Ionomidotis fulvotogens* (Berk. et Curt.) Cash, Braunschwarzer Rindenbecher  
Nachw.: KR 2, Nr. 367 - Abb.: BK 1/202

***Kotlabaea* Svrc. (Humariaceae)**

vgl. *Byssonectria*

*Kotlabaea deformis* (Karst.) Svrc.

Nachw.: KR 2

***Lachnellula* Karst. (Hyaloscyphaceae)**

*Lachnellula calyciformis* (Willd.: Fr.) Dharne, Pokalförmiges Haarbecherchen

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/230; C 2122

*Lachnellula calycina* s. *L. subtilissima*

*Lachnellula gallica* (Karst. et Hariot) Dennis

Nachw.: KR 2

*Lachnellula hahniana* s. *L. occidentalis*

*Lachnellula occidentalis* (Hahn et Ayers) Dharne, Lärchen-Haarbecherchen

= *L. hahniana* (Seav.) Dennis

**Beleg:** Gerolstein 5705, RS 1980 (als *L. hahniana*) - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/233; RH 657

*Lachnellula subtilissima* (Cke.) Dennis, Weißtannen-Haarbecherchen

= *Trichoscyphella calycina* (Schum.: Fr.) Nannf.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/235; CE 4/517

***Lamprospora* de Not. (Humariaceae)**

*Lamprospora carbonicola* Boud.

= *L. carbonaria* (Fuck.) Seav.; = *L. dictydiola* Boud. [non ss. Benkert]

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2932

***Lasiosphaeria* Ces. et de Not. (Sordariaceae)**

*Lasiosphaeria spermoides* (Hoffm.: Fr.) Ces. et de Not., Gesäter Kohlenkugelpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/336; C 2131

***Leotia* Hill. ex Pers.: Fr. (Leotiaceae)**

*Leotia lubrica* (Scop.) Pers., Grüngelbes Gallertkäppchen

=? *L. atrovirens* Pers.

Beleg: Hinterhausen 5705, L 1971 - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/136; CE 4/493; RH 643

*Leptopodia* s. *Helvella atra*, *elastica*, *ephippium*, *latispora* oder *spadicea*

***Leucoscypha* Boud. (Humariaceae)**

*Leucoscypha leucotricha* (Alb. et Schw.: Fr.) Boud., Weißhaariger Borstenbecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/69; C 2102

*Lophium* s. *Glyphium*

*Macroscyphus* s. *Helvella macropus*

***Mamiania* Ces. et de Not. (Diaporthaceae)**

*Mamiania fimbriata* (Pers. ex Fr.) Ces. et de Not.

Nachw.: JAAP, 1910

***Marcelleina* v. Brumm. (Pezizaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Martininia* Dumont et Korf (Sclerotiniaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Massaria* de Not. (Pleosporaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

*Maublancomyces* s. *Gyromitra*

***Melanamphora* Laflamme (Pseudovalsaceae)**

= *Melogramma* Fr. pp.



*Melanamphora spiniferum* (Wallr.) Laflamme, Rasigkrustiger Buchen-Kugelpilz

Nachw.: JAAP, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/370; C 3017

***Melanconis* Tul. et C. Tul. (Melanconidaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Melanomma* Nitschke ex Fuck. (Pleosporaceae)**

*Melanomma pulvis-pyrius* (Pers.: Fr.) Fuck., Brandschwarzes Kugelkissen

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/384

***Melastiza* Boud. (Humariaceae)**

*Melastiza chateri* (W. G. Smith) Boud., Roter Kurzhaarborstling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/91; CE 4/463

*Melogramma* s. *Melanamphora*

***Microglossum* Gill. (Geoglossaceae)**

*Microglossum olivaceum* (Pers.: Fr.) Gill.

Nachw.: KR 2 - Abb.: RH 638

*Microglossum viride* (Pers.: Fr.) Gill., Grüne Erdzunge

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Geoglossum* v.); KR 2 - Abb.: BK 1/137; C 2115; RH 638

***Microstoma* Bernst. (Sarcoscyphaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Miladina* Svrc. (Humariaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

*Mitrophora* s. *Morchella*

***Mitrula* Pers.: Fr. (Geoglossaceae)**

*Mitrula abietis* s. *Heyderia* a.

*Mitrula paludosa* Fr., Sumpf-Haubenpilz

= *M. omphalostoma* Benedix

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/139; CE 4/495; RH 639

***Mniaecia* Boud. (Leotiaceae)**

*Mniaecia jungermanniae* (Fr.) Boud.

Nachw.: KR 2

***Mollisia* (Fr.) Karst. (Dermateaceae)**

*Mollisia cinerea* (Batsch) Karst., Aschfahles Weichbecherchen

Nachw.: JAAP, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/274; CE 4/521

*Mollisia melaleuca* (Fr.) Sacc., Schwarzweißes Weichbecherchen

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/278; C 2563

*Mollisia rabenhorstii* (Auerswald) Rehm

Nachw.: KR 2

***Monilinia* Honey (Sclerotiniaceae)**

= *Sclerotinia* Fuck.

*Monilinia baccarum* (Schröt.) Whetzel

Nachw.: JAAP, 1910

***Morchella* St. Am. (Morchellaceae)**

*Morchella conica* s. *M. elata*

*Morchella elata* Fr., Spitz-Morchel

= *M. conica* Pers.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/1 und 2; CE 4/399, 401, 403 und 405; RH 608

*Morchella esculenta* (L.) Pers., Speise-Morchel

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 2 - Abb.: BK 1/3-6; CE 4/391, 393 und 395 (als *M. crassipes*); C 2085 (als *M. vulgaris*); RH 608

*Morchella gigas* (Batsch: Fr.) Pers., Käppchen-Morchel

= *Mitrophora semilibera* (DC.: Fr.) Lév.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/7; CE 4/407

*Morchella semilibera* s. *M. gigas*

***Myriosclerotinia* Buchw. (Sclerotiniaceae)**

= *Sclerotinia* Fuck.

Eine unbestimmte Art in der Eifel nachgewiesen (EBERT, 1987: *M. duriaeana* oder *M. sulcatula*?)

***Nectria* Fr. (Hypocreaceae)**

*Nectria cinnabarina* (Tode: Fr.) Fr., Zinnoberroter Pustelpilz

= *N. ochracea* (Grev. et Fr.) Fr.

Nachw.: JAAP, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/324; CE 4/529; RH 667

*Nectria coccinea* (Pers.: Fr.) Fr., Scharlachroter Pustelpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/325; C 2128

*Nectria fuckeliana* C. Booth, Nadelholz-Pustelpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/328; C 2129

*Nectria ochracea* s. *N. cinnabarina*

***Nectriopsis* Mre. (Hypocreaceae)**

*Nectriopsis aureonitens* (Tul.) Mre.

Beleg: Gerolstein 5706, WG 1980 - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81

*Neobulgaria* s. *Ombrophila*

***Neodasyscypha* Spooner (Hyaloscyphaceae)**

*Neodasyscypha cerina* (Pers.: Fr.) Spooner, Wachsgelbes Haarbecherchen

= *Dasyscyphus cerinus* (Pers.: Fr.) Fuck.

Nachw.: JAAP, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/217; CE 4/515

***Neottiella* (Cke.) Sacc. emend. Boud. (Humariaceae)**

*Neottiella rutilans* (Fr.) Dennis, Gelblichroter Moosborstling

Nachw.: KR 2

***Octospora* Hedw. ex S. F. Gray emend. Korf (Humariaceae)**

s. auch *Byssonectria*

*Octospora alpestris* s. *O. axillaris* var. *axillaris*

*Octospora axillaris* (Nees ex Pers.) Mos. var. *axillaris*

= *O. alpestris* (Sommerf.) Dennis et Itzerott; = *O. axillaris*; = *O. carneola* (Sauter) Dennis

Nachw.: KR 2

*Octospora axillaris* var. *dennisii* Itzerott

Nachw.: KR 2

*Octospora carbonigena* s. *Byssonectria fusispora*

*Octospora carneola* s. *O. axillaris* var. *axillaris*

*Octospora melina* (Vel.) Dennis et Itzerott

Nachw.: KR 2

***Olla* Vel. (Hyaloscyphaceae)**

*Olla transiens* (v. Höhn.) Baral

Nachw.: KR 2

***Ombrophila* Fr. (Leotiaceae)**

*Ombrophila foliacea* s. *O. pura* var. *foliacea*

*Ombrophila janthina* Karst. non Fr., Fichtenzapfen-Kreisling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/160; C 2961

*Ombrophila pura* (Pers.: Fr.) Baral in Baral et Krglst. var. *pura*, Buchen-Kreisling

= *Neobulgaria p.* (Pers.: Fr.) Petrak

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/163; CE 4/505; RH 643

*Ombrophila pura* var. *foliacea* (Bres.) Dennis et Gamundi

= *Neobulgaria foliacea* (Bres.) Dennis

Nachw.: EBERT, 1987 - Abb.: BK 1/164

### ***Onygena* Fr. (Onygenaceae)**

*Onygena corvina* Alb. et Schw.: Fr., Wollpilz

**Beleg:** leg. et det. B. Oertel 31.10.92, Remagen, auf einem alten Wollhandschuh, PE...., **Neufund für das Gebiet** - Abb.: BK 1/374; RH 677

*Onygena equina* (Willd.) Pers. ex Fr., Hornpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/375; CE 4/543

### ***Orbilium* Fr. (Orbiliaceae)**

*Orbilium aurantiorubra* Boud.

Nachw.: KR 2

*Orbiliopsis* s. *Phaeohelotium*

### ***Otidea* (Pers.) Bon. (Pezizaceae)**

*Otidea abietina* (Pers.) Fuck., Nadelwald-Öhrling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/59; CE 4/453

*Otidea alutacea* (Pers.) Mass., Ledergelber Öhrling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/60; C 2098

*Otidea bufonia* (Pers.) Boud., Kröten-Öhrling

= *O. grandis* (Pers.) Arnaud

**Beleg:** Hinterhausen 5705, WG 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2099

*Otidea cantharella* s. *Flavoscypha* c.

*Otidea cochleata* (L. ex St. Am.) Fuck., Schnecken-Öhrling

= *O. umbrina* (Pers.) Bres.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/61; CE 4/453; RH 626 (?) (als *O. bufonia*)

*Otidea concinna* s. *Flavoscypha cantharella*

*Otidea grandis* s. *O. bufonia*

*Otidea leporina* (Batsch) Fuck., Hasenohr

**Beleg:** Oos 5705, RS 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 2

*Otidea onotica* (Pers.: Fr.) Fuck., Eselsohr

**Beleg:** Gindorf 5905, Biol. Stat. Weijster - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 2 - Abb.: CE 4/451; RH 626

*Otidea umbrina* s. *O. cochleata*

***Pachyella* Boud. emend. Pfister (Pezizaceae)**

*Pachyella babingtonii* (Berk. et Br.) Boud.

= *Psilopezia b.* (Berk. et Br.) Berk.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/56; C 2109

***Pachyphloeus* Tul. et C. Tul. (Terfeziaceae)**

*Pachyphloeus conglomeratus* Berk. et Br.

Nachw.: KR 2

***Parascutellinia* Svrc. (Humariaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

*Paxina* s. *Helvella acetabulum*, *leucomelaena* oder *solitaria*

*Peckiella* s. *Hypomyces*

***Perrotia* Boud. (Hyaloscyphaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Pezicula* Tul. et C. Tul. (Dermateaceae)**

*Pezicula acericola* (Peck) Sacc., Ahorn-Rindenbecherchen

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/257

*Pezicula carpinea* (Pers.) Tul. ex Fuck., Hainbuchen-Rindenbecherchen

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/258; CE 4/519

*Pezicula livida* (Berk. et Br.) Rehm, Nadelholz-Rindenbecherchen

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/259

***Peziza* Fr. (Pezizaceae)**

*Peziza ampelina* Quél., Weinroter Becherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/35; C 2093

*Peziza anthracophila* s. *P. echinospora*

*Peziza arvernensis* Boud., Buchenwald-Becherling

= *P. sylvestris* Boud.

(vgl. *P. cerea*, *P. micropus*, *P. repanda* und *P. varia*)

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/36; C 2096

*Peziza badia* Pers.: Fr., Kastanienbrauner Becherling

**Beleg:** leg. et det. T. R. Lohmeyer 09.08.86, Nonnenbachtal bei Blankenheimerwald, PE.... - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/37; RH 624

*Peziza badioconfusa* Korf

Nachw.: KR 2 - Abb.: CE 4/447

*Peziza cerea* Bull.: Fr., Wachs-Becherling

= *P. muralis* Sow.; = *P. tectoria* Cke.

(vgl. *P. arvernensis*, *P. micropus*, *P. repanda* und *P. varia*)

Nachw.: KR 2 - Abb.: CE 4/445; RH 624

*Peziza depressa* Pers.: Fr., Rotbrauner Becherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/39

*Peziza echinospora* Karst., Brauner Brandstellenbecherling

= *P. anthracophila* Dennis

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/41

*Peziza gerardii* Cke.

= *P. ionella* Quél.

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2918

*Peziza granularis* Donadini, Granulierter Becherling

= *P. granulosa* Schum. ss. Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/42; C 2097

*Peziza granulosa* s. *P. granularis*

*Peziza ionella* s. *P. gerardii*

*Peziza limnaea* Maas-Geest., Schlamm-Becherling

= *P. limosa* (Grelet) Nannf.; = *Galactinia limosa* (Grelet) Le Gal et Romagn.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/44; C 2920

*Peziza limosa* s. *P. limnaea*

*Peziza lobulata* (Vel.) Svrc., Violetter Becherling

= *P. violacea* Pers. ss. Dennis [non ss. Mos.]

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/55; CE 4/449

*Peziza michelii* (Boud.) Dennis, Gelbfleischiger Lila-Becherling

= *P. plebeia* (Le Gal) Nannf.

**Beleg:** leg. et det. H. Schnackertz 27.06.87, Satzvey, PE.... - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/45; C 2092 und 2548; RH 623

*Peziza micropus* Pers., Kurzstieliger Holzbecherling

(vgl. *P. arvernensis*, *P. cerea*, *P. repanda* und *P. micropus*)

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/46; C 2095

*Peziza muralis* s. *P. cerea*

*Peziza plebeia* s. *P. michelii*

*Peziza praetervisa* s. *P. tenacella*

*Peziza repanda* Pers., Ausgebreiteter Becherling

(vgl. *P. arvernensis*, *P. cerea*, *P. micropus* und *P. varia*)

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 - Abb.: CE 4/443; RH 625

*Peziza succosa* Berk., Gelbmilchender Becherling

**Beleg:** Berlingen 5706, RS 1980; Heiligenstein b. Gerolstein 5706, RS 1980; Müllenborn 5705, WG 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/52; C 2091; RH 623

*Peziza sylvestris* s. *P. arvernensis*

*Peziza tectoria* s. *P. cerea*

*Peziza tenacella* Phill. in Cke., Braunvioletter Brandstellenbecherling

= *P. praetervisa* Bres.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/49; C 2094

*Peziza varia* (Hedw.) Fr., Riesenbecherling



(vgl. *P. arvernensis*, *P. cerea*, *P. micropus* und *P. repanda*)

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/53; CE 4/443

*Peziza vesiculosa* Bull.: St. Am., Blasiger Becherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/54; CE 4/445; RH 625

*Peziza violacea* ss. Dennis s. *P. lobulata*

***Pezizella* Fuck. (Leotiaceae)**

vgl. *Calycellina* und *Calycina*

*Pezizella fagi* (Jaap) Matheis

Nachw.: KR 2, Nr. 163

***Pezoloma* Clements (Leotiaceae)**

= *Sphagnicola* Vel.

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Phaeohelotium* Kanouse (Hyaloscyphaceae)**

= *Orbiliopsis* v. Höhn.; vgl. *Hymenoscyphus*

*Phaeohelotium italicum* (Sacc.) Dennis

Nachw.: KR 2, Nr. 222

*Phaeohelotium subcarneum* (Schum. ex Sacc.) Dennis, Blau-fleischfarbenes Holzbecherchen

Nachw.: KR 2, Nr. 785 - Abb.: BK 1/173

*Phaeohelotium umbilicatum* s. *Hymenoscyphus epiphyllus*

***Phialea* s. *Cyathicula***

***Phyllachora* Nitschke ex Fuck. (Phyllachoraceae)**

*Phyllachora graminis* (Pers.) Fuck.

Nachw.: JAAP, 1910

***Picoa* Vitt. (Terfeziaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Pithya* Fuck. (Sarcoscyphaceae)**

*Pithya cupressina* (Fr.) Fuck., Dottergelber Tannenbecherling

= *P. vulgaris* Fuck.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/119

***Plectania* Fuck. (Sarcoscyphaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Pleomassaria* Speg. (Pleomassariaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Plicaria* Fuck. (Pezizaceae)**

*Plicaria anthracina* s. *P. carbonaria*

*Plicaria carbonaria* (Fuck.) Fuck.

= *P. anthracina* (Cke.) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/33

*Plicaria endocarpoides* (Berk.) Rifai

= *P. fuliginea* (Schum.); = *P. leiocarpa* (Currey) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: CE 4/449

*Plicaria fuliginea* s. *P. endocarpoides*

*Plicaria leiocarpa* s. *P. endocarpoides*

*Plicaria trachycarpa* (Currey) Boud.

Nachw.: KR 2

***Podophacidium* Niessl (Dermateaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Podosordaria* Ellis et Holway (Sphaeriaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen (nur Norddeutschland?)

***Podostroma* Karst. (Hypocreaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Polystigma* DC. (Phyllachoraceae)**

*Polystigma rubrum* (Pers.: Fr.) DC.

Nachw.: JAAP, 1910

***Poronia* Willd. ex S. F. Gray (Xylariaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen (nur Norddeutschland?)

***Propolis* s. *Propolomyces***

***Propolomyces* Sherw. (Rhytismataceae)**

= *Propolis* (Fr.) Fr.

*Propolomyces versicolor* (Fr.) Dennis, Grauweißes Holzscheibchen

Nachw.: KR 2 - Lit.: DENNIS, 1981, S. 218 und Nachtr. S. 16 - Abb.: BK 1/289; C 2983

***Prosthecium* vgl. *Calospora***

***Protocrea* Petch (Hypocreaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Pseudombrophila* Boud. (Humariaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Pseudoplectania* Fuck. (Sarcoscyphaceae)**

*Pseudoplectania nigrella* (Pers.: Fr.) Fuck., Glänzender Schwarzborstling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/121; RH 632

***Pseudotis* (Boud.) Boud. (Pezizaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Pseudovalsia* Ces. et de Not. (Pseudovalsaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Psilachnum* v. Höhn. (Hyalscyphaceae)**

*Psilachnum inquilinum* (Karst.) Dennis, Schachtelhalm-Wollbecherchen  
= *Dasyscyphus inquilinus* (Karst.) Winter  
Nachw.: KR 2, Nr. 1619 - Abb.: BK 1/238

***Psilopezia* Berk. emend Pfist. (Humariaceae)**

(vgl. *Pachyella*)

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Ptychoverpa* s. *Verpa***

***Pulvinula* Boud. (Humariaceae)**

*Pulvinula convexella* (Karst.) Pfister, Rotleuchtender Kissenbecherling  
= *P. constellatio* (Berk. et Br.) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/107; C 2933

***Pustularia* s. *Tarzetta***

***Pycnopeziza* White et Whetzel (Sclerotiniaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Pyronema* Carus (Humariaceae)**

*Pyronema domesticum* (Sow.: Fr.) Sacc., Großsporiger Brandstellenbecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/117; C 2937

*Pyronema omphalodes* (Bull.: St. Am.) Fuck.

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2938

***Quaternaria* s. *Eutypella***

***Ramsbottomia* Buckley (Humariaceae)**

*Ramsbottomia asperior* (Nyl.) Benkert et T. Schumacher (vgl. *Scutellina trechispora*)

= *Scutellinia a.* (Nyl.) Dennis; = *Sphaerospora a.* (Nyl.) Sacc.

Nachw.: KR 2

***Rhizina* Fr. (Helvellaceae)**

*Rhizina undulata* Fr.: Fr., Wurzellorchel

= *R. inflata* (Schaeff.) Quél.

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 2 - Abb.: BK 1/32; CE 4/435; RH 614

***Rhodotarzetta* Dissing et Sivertsen (Pezizaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Rhopographus* Nitschke in Fuck. (Pleosporaceae)**

*Rhopographus filicinus* (Fr.) Nitschke ex Fuck., Adlerfarn-Fleckenpilz

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/383; C 3023

***Rhytisma* Fr. (Rhytismataceae)**

*Rhytisma acerinum* (Pers.: St. Am.) Fr., Ahorn-Runzelschorf

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/291; CE 4/521

*Rhytisma salicinum* (Pers.) Fr., Weiden-Runzelschorf

Nachw.: KR 2 - Abb.: RH 658

***Rutstroemia* Karst. (Sclerotiniaceae)**

*Rutstroemia bolaris* (Batsch: Fr.) Rehm, Gelber Stromabecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/149

*Rutstroemia calopus* (Fr.) Rehm

Nachw.: KR 2

*Rutstroemia echinophila* (Bull. ex Mér.) v. Höhn., Kastanienschalen-Becherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/151; CE 4/501

*Rutstroemia elatina* (Alb. et Schw.: Fr.) Rehm, Weißtannen-Stromabecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/152; C 2120

*Rutstroemia firma* (Pers.) Karst., Zäher Stromabecherling

**Beleg:** Gerolstein 5705, RS 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/153; CE 4/503; RH 654

*Rutstroemia luteovirescens* (Rob. ex Desm.) White, Ockergelber Stromabecherling

Beleg: Oos 5705, RS 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/154

*Rutstroemia sydowiana* (Rehm) White, Eichenblatt-Stromabecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/157

### ***Sarcoscypha* (Fr.) Boud. (Sarcoscyphaceae)**

*Sarcoscypha austriaca* (Beck ex Sacc.) Boud.

Bad Bodendorf, leg. M. Schröder, det. Baral, **neu für das Gebiet**

*Sarcoscypha coccinea* (Scop. ex Fr.) Lamb., Zinnoberroter Prachtbecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/120; CE 4/471; RH 635

*Sarcoscypha jurana* (Boud.) Baral

Nachw.: KR 2

### ***Sarcosoma* Caspari in Rehm (Sarcoscyphaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

### ***Sarcosphaera* Auersw. (Pezizaceae)**

*Sarcosphaera coronaria* (Jacq.: Cke.) Boud., Kronenbecherling

= *S. crassa* (Santi: Steudel) Pouz.; = *S. eximia* (Dur. et Lév.) Mre.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/34; CE 4/451; RH 621

### ***Sclerotinia* Fuck. (Sclerotiniaceae)**

s. auch *Botryotinia*, *Ciboria*, *Dumontinia*, *Monilinia*, *Myriosclerotinia* und *Rutstroemia*

*Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) de Bary, Gemeiner Sklerotienbecherling

= *S. ficariae* Rehm; = *S. henningsiana* Kirschst.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/143

### ***Scutellinia* (Cke.) Lamb. emend. Le Gal (Humariaceae)**

s. auch *Ramsbottomia*, *Sphaerosporella* und *Trichophaea*

*Scutellinia armatospora* s. *S. trechispora*

*Scutellinia asperior* s. *Ramsbottomia a.*

*Scutellinia brunnea* s. *Sphaerosporella b.*

*Scutellinia diaboli* s. *S. trechispora*

*Scutellinia erinaceus* (Schw.: Fr.) O. Kuntze

Nachw.: KR 2

*Scutellinia hybrida* s. *Trichophaea h.*

*Scutellinia kerguelensis* (Berk.) O. Kuntze

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/81

*Scutellinia pseudotrechispora* (Schröt.) Le Gal

Nachw.: KR 2

*Scutellinia scutellata* (L.: Fr.) Lamb., Gemeiner Schildborstling

**Beleg:** Moß b. Gerolstein 5706, HA 1980; Oos 5705, RS 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/82; CE 4/459

*Scutellinia trechispora* (Berk. et Br.) Lamb., Rundsporiger Schildborstling (vgl. *Ramsbottomia asperior*)

= *S. armatospora* Denison; = *S. diaboli* (Vel.) Le Gal; = *Sphaerospora t.* (Berk. et Br.) Sacc.

**Belege:** leg. B. Oertel 27.06.87, Heiligenstein bei Gerolstein, det. H. Schnackertz (als *S. diaboli*), PE....; Gees 5706, HA 1980; Hinterhausen 5705, JG 1980; Gerolstein 5705, RS 1980 (alle als *S. armatospora*) - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/79

*Scutellinia umbrorum* (Fr.) Lamb., Orangeroter Schildborstling

= *S. umbrarum*

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/83; C 2552

*Sepultaria* s. *Geopora*

**Sillia** Karst. (Gnomoniaceae)

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

**Smaradæa** Svrc. (Humariaceae)

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

**Sowerbyella** Nannf. (Pezizaceae)

*Sowerbyella rhenana* (Fuckel) J.Moravec 1985

= *Aleuria rhenana* Fuckel 1869

= *Aleuria splendens* Quélet 1873

= *Peziza rhenana* (Fuck.) Boudier 1908

***Spathularia* Pers. (Geoglossaceae)**

*Spathularia flava* Pers., Dottergelber Spateling

= *S. flavida* Pers.: Fr.

**Beleg:** Gerolstein 5705, RS 1980 - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *S. clavata*); KR 2 - Abb.: BK 1/141; CE 4/495

*Sphaerospora* s. *Ramsbottomia*, *Scutellinia*, *Sphaerosporella*

***Sphaerosporella* (Svrc.) Svrc. et Kub. (Humariaceae)**

*Sphaerosporella brunnea* (Alb. et Schw.) Svrc. et Kub., Kugelsporiger Brandstellen-Schildborstling

= *Sphaerospora b.* (Alb. et Schw.) Mass.; = *Scutellinia b.* (Alb. et Schw.) O. Kuntze

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/84; C 2104 und 2928

*Sphagnicola* s. *Pezoloma*

***Stephensia* Tul. (Tuberaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Strattonia* Cifferi emend. Lundquist (Lasiosphaeriaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Symphyosirinia* E. A. Ellis (Leotiaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

Lit.: BARAL, 1994

***Tapesia* Fuck. (Dermateaceae)**

*Tapesia fusca* (Pers. ex Mér.) Fuck., Dunkelgraues Filzbecherchen

Nachw.: KR 2, Nr. 1156 - Abb.: BK 1/266; C 2975

*Tapesia rosae* (Pers.) Fuck., Rosen-Filzbecherchen

Nachw.: KR 2, Nr. 1182 - Abb.: BK 1/269; C 2976

***Tarzetta* (Cke.) Lamb. (Pezizaceae)**

= *Pustularia* Fuck.



*Tarzetta catinus* (Holmsk.: Fr.) Korf et Rogers, Tigelförmiger Kelchbecherling

**Belege:** leg. et det. H. Schnackertz 1987, Remagen, Paraphysen an der Spitze gelappt, PE....; Gerolstein 5705, CH 1980; Gerolstein 5706, RS 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/63; CE 4/457 oben; RH 627

*Tarzetta cupularis* (L.: Fr.) Lamb., Napfförmiger Kelchbecherling

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/64; C 2100; CE 4/457 unten

***Thecotheus* Boud. (Ascobolaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

*Tricharia* s. *Tricharina*

***Tricharina* Eckbl. (Humariaceae)**

*Tricharina groenlandica* ??Autor

Nachw.: KR 2

*Tricharina praecox* (Karst.) Dennis

= *Tricharia* p. (Karst.) Boud.

Nachw.: KR 2; Lit.: DENNIS, 1981, S. 38 und Nachtr. S. 2

***Trichoglossum* Boud. (Geoglossaceae)**

*Trichoglossum hirsutum* (Pers.: Fr.) Boud., Rauhaarige Erdzunge

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/131; CE 4/493

***Trichopeziza* Fuck. (Hyaloscyphaceae)**

*Trichopeziza mollissima* (Lasch) Fuckel

= *Dasyscyphus mollissimus* (Lasch) Dennis

Nachw.: JAAP, 1910 (als *Lachnum leucophaeum*) - Abb.: BK 1/221

*Trichopeziza sulphurea* (Pers.: Fr.) Fuck., Schwefelgelbes Haarbechechen

= *Dasyscyphus sulfureus* (Pers.: Fr.) Mass.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/226; CE 4/513

***Trichophaea* Boud. (Humariaceae)**

*Trichophaea abundans* (Karst.) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2926

*Trichophaea gregaria* s. *T. hybrida*

*Trichophaea hemisphaerioides* (Mouton) Graddon

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/75; C 2550

*Trichophaea hybrida* (Sow.) Schumacher, Geselliger Borstling

= *Scutellinia* h. (Sow.) O. Kuntze; = *T. gregaria* (Rehm) Boud.

Nachw.: KR 2; Lit.: DENNIS, 1981, S. 39 und Nachtr. S. 3 - Abb.: BK 1/74

*Trichophaea livida* (Schum.) Boud.

= *Humaria l.* (Schum.) Mos.

Nachw.: KR 2

*Trichophaea woolhopeia* (Cke. et Phill. in Cke.) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/76; C 2925

***Trichophaeopsis* Korf et Erb (Humariaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Trichoscyphella* s. *Lachnellula***

***Tuber Micheli* ex Fr. (Tuberaceae)**

*Tuber excavatum* Vitt., Olivbraune Trüffel

Nachw.: KR 2 - Abb.: CE 4/487

*Tuber puberulum* Berk. et Br.

**Beleg:** Gerolstein 5705, GV 1980 - Nachw.: KR 2 - Abb.: C 2951

***Tympanis* Tode (Leotiaceae)**

*Tympanis xylophila* Kirschstein

Nachw.: KR 2, Nr. 336

***Urceolella* Boud. (Hyaloscyphaceae)**

*Urceolella conspicua* Huhtinen

Nachw.: KR 2

***Urnula* Fr. (Pezizaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

*Ustulina* s. *Hypoxylon*

***Valsa* Fr. emend. Sacc. (Valsaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Valsaria* Ces. et de Not. (Trichosphaeriaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Velutarina* Korf ex Korf (Leotiaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Venturia* de Not. (Venturiaceae)**

*Venturia geranii* (Fr.: Fr.) Winter in Rabenh.

=? *Stigmatea geranii* (Fr.) Fr.

Nachw.: Jaap, 1910 (als *Euryachora* g.)

***Verpa* Swartz (Morchellaceae)**

*Verpa agaricoides* s. *V. conica*

*Verpa bohémica* (Krombh.) Schröt. in Cohn, Böhmisches Verpel

= *Ptychoverpa b.* (Krombh.) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/9; CE 4/411; RH 609

*Verpa conica* (Müller: Fr.) Swartz, Fingerhut-Verpel

= *V. agaricoides* (DC.) Pers.; = *V. digitaliformis* Pers.: Fr.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/8; CE 4/409; RH 609

*Verpa digitaliformis* s. *V. conica*

***Verpatinia* Whetzel et Drayton (Sclerotiniaceae)**

in der Eifel noch nicht nachgewiesen

***Vibrissea* Fr. (Dermateaceae)**

*Vibrissea decolorans* (Sautt.) Sánchez et Korf, Dünnsporiges Kranzbecherchen

= *Apostemidium leptosporum* (Berk. et Br.) Boud.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/301; C 2984

*Vibrissea filisporia* (Bon.) Korf et Sánchez in Sánchez var. *fiscella* (Karst.) Sánchez, Körbchenförmiges Kranzbecherchen

= *Apostemidium fiscellum* (Karst.) Karst.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/300

*Vibrissea fiscella* s. *V. filisporia* var. *fiscella*

*Vibrissea leptospora* s. *V. decolorans*

*Vibrissea truncorum* (Alb. et Schw.) Fr.

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/299; CE 4/523; RH 659

***Xylaria* Hill ex Schrank (Xylariaceae)**

= *Xylosphaera* Dumort.

*Xylaria carpophila* (Pers.) Fr., Bucheckern-Holzkeule

Nachw.: FUCHS, 1993; Jaap, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/347; C 2133

*Xylaria filiformis* (Alb. et Schw.: Fr.) Fr., Fädige Holzkeule

Nachw.: KR 2 - Abb.: BK 1/348; C 3006

*Xylaria hypoxylon* (L.: Hook.) Grev., Geweihförmige Holzkeule

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; JAAP, 1910; KR 2 - Abb.: BK 1/349

*Xylaria longipes* Nitschke, Langstielige Ahorn-Holzkeule

**Belege:** leg. B. Oertel und J. Strick 25.08.91, Hundsbachtal bei Birresborn, det. H. G. Fuchs, PE....; Gees 5706, HA 1980 - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 2 - Abb.: BK 1/350; CE 4/533

*Xylaria oxyacanthae* Tul., Weißdornfrucht-Holzkeule

Nachw.: KR 2

*Xylaria polymorpha* (Pers.: Mér.) Grev., Vielgestaltige Holzkeule

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; KR 2 - Abb.: BK 1/351

*Xylosphaera* s. *Xylaria*